


■ ■ 二次医療圏標準化該当比 ■ ■

- 【県北】 福島市・二本松市・本宮市・伊達市・川俣町・桑折町・国見町・大玉村
- 【県中】 郡山市・須賀川市・田村市・鏡石町・天栄村・石川町・玉川村・平田村・
浅川町・古殿町・三春町・小野町
- 【県南】 白河市・棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町
- 【会津】 会津若松市・喜多方市・磐梯町・猪苗代町・北塩原村・西会津町・
会津坂下町・湯川村・柳津町・会津美里町・三島町・金山町・昭和村
- 【南会津】 南会津町・下郷町・只見町・桧枝岐村
- 【相双】 相馬市・南相馬市・広野町・楢葉町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・
葛尾村・新地町・飯舘村
- 【いわき】 いわき市

県北(平成26年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	39,124	9,507	10,122.0	93.9	92.5	95.4	▽▽
メタボ予備群	39,124	6,892	7,090.9	97.2	95.4	99.0	▽▽
肥満者	39,149	19,841	20,679.3	95.9	95.1	96.8	▽▽
高血圧症有病者	39,154	18,634	18,655.9	99.9	99.0	100.8	▽
高血圧症予備群	38,859	5,666	5,740.9	98.7	96.7	100.8	▽
糖尿病有病者	39,154	4,682	4,996.9	93.7	91.5	95.9	▽▽
糖尿病予備群	32,039	4,673	4,710.1	99.2	97.0	101.5	▽
脂質異常症有病者	39,154	21,235	21,639.7	98.1	97.4	98.9	▽▽
習慣的喫煙者	39,154	13,452	13,922.3	96.6	95.5	97.8	▽▽
習慣的飲酒者	37,653	17,516	17,378.8	100.8	99.9	101.7	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ...
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 肥満者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者, 習慣的喫煙者,

2)


収縮期血圧高値	38861	18,488	18,456.5	100.2	99.3	101.1	▲
拡張期血圧高値	38,860	11,125	10,911.0	102.0	100.6	103.3	▲▲
血圧高値	38,862	20,163	20,095.3	100.3	99.5	101.2	▲
空腹時血糖高値	26,011	11,822	12,168.7	97.2	96.1	98.3	▽▽
HbA1c高値	22,462	10,481	10,680.1	98.1	96.9	99.3	▽▽
血糖高値	32,039	17,104	17,481.6	97.8	97.0	98.7	▽▽
中性脂肪高値	39,105	10,541	10,866.0	97.0	95.7	98.4	▽▽
HDL-C低値	39,107	3,300	3,511.0	94.0	91.4	96.7	▽▽
LDL-C高値	39,102	20,087	20,124.3	99.8	99.0	100.6	▽
脂質異常	39,109	25,231	25,491.2	99.0	98.4	99.6	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 拡張期血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 中性脂肪高値, HDL-C低値, 脂質異常, 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,

県北(平成26年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	39,253	3,343	3,651.4	91.6	89.0	94.2	▽▽
メタボ予備群	39,253	2,184	2,390	91	88	95	▽▽
肥満者	39,280	10,164	10,947.9	92.8	91.5	94.2	▽▽
高血圧症有病者	39,288	14,145	14,152.6	99.9	98.8	101.1	▽
高血圧症予備群	38,556	5,201	5,151.6	101.0	98.8	103.2	▲
糖尿病有病者	39,288	2,339	2,558.6	91.4	88.3	94.6	▽▽
糖尿病予備群	34,123	4,563	4,639.8	98.3	96.1	100.7	▽
脂質異常症有病者	39,288	20,353	20,435.0	99.6	98.8	100.4	▽
習慣的喫煙者	39,288	3,038	3,385.6	89.7	87.1	92.5	▽▽
習慣的飲酒者	38,227	3,886	3,952.5	98.3	95.8	100.9	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ...
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 肥満者, 糖尿病有病者, 習慣的喫煙者,

2)


収縮期血圧高値	38,560	14,618	14,403.8	101.5	100.4	102.6	▲▲
拡張期血圧高値	38,556	6,120	5,759.9	106.3	104.2	108.4	▲▲
血圧高値	38,560	15,520	15,226.5	101.9	100.9	103.0	▲▲
空腹時血糖高値	28,052	7,546	7,898.9	95.5	94.0	97.1	▽▽
HbA1c高値	27,769	13,127	13,351.2	98.3	97.3	99.4	▽▽
血糖高値	34,123	15,930	16,424.9	97.0	96.0	97.9	▽▽
中性脂肪高値	39,242	4,994	5,041.8	99.1	96.9	101.3	▽
HDL-C低値	39,243	649	754.5	86.0	80.4	92.0	▽▽
LDL-C高値	39,242	21,969	21,833.1	100.6	99.9	101.4	▲
脂質異常	39,243	23,793	23,707.8	100.4	99.7	101.0	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値, HDL-C低値,

県中(平成26年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	34,483	8,851	8,909.2	99.3	97.8	100.9	▽
メタボ予備群	34,483	5,881	6,250.8	94.1	92.2	96.0	▽▽
肥満者	34,553	17,938	18,246.5	98.3	97.4	99.2	▽▽
高血圧症有病者	34,563	16,301	16,435.8	99.2	98.2	100.2	▽
高血圧症予備群	33,862	4,755	5,003.7	95.0	92.8	97.3	▽▽
糖尿病有病者	34,563	4,366	4,398.1	99.3	96.9	101.7	▽
糖尿病予備群	27,865	4,428	4,106.3	107.8	105.3	110.4	▲▲
脂質異常症有病者	34,563	19,038	19,102.3	99.7	98.8	100.5	▽
習慣的喫煙者	34,563	12,304	12,309.4	100.0	98.7	101.2	▽
習慣的飲酒者	31,400	14,339	14,507.7	98.8	97.8	99.9	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 糖尿病予備群,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ予備群, 肥満者, 高血圧症予備群, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	33863	15,356	16,064.9	95.6	94.6	96.6	▽▽
拡張期血圧高値	33,862	9,784	9,501.9	103.0	101.5	104.5	▲▲
血圧高値	33,863	17,033	17,494.0	97.4	96.5	98.3	▽▽
空腹時血糖高値	23,819	10,777	11,080.7	97.3	96.1	98.4	▽▽
HbA1c高値	19,831	10,392	9,528.7	109.1	107.8	110.4	▲▲
血糖高値	27,866	15,933	15,228.5	104.6	103.7	105.6	▲▲
中性脂肪高値	34,491	9,425	9,587.7	98.3	96.8	99.8	▽▽
HDL-C低値	34,496	2,853	3,097.9	92.1	89.3	95.0	▽▽
LDL-C高値	34,490	17,491	17,757.5	98.5	97.6	99.4	▽▽
脂質異常	34,498	22,243	22,490.4	98.9	98.2	99.6	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 拡張期血圧高値, HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常, 空腹時血糖高値,

県中(平成26年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	35,726	3,178	3,306.9	96.1	93.3	98.9	▽▽
メタボ予備群	35,726	1,974	2,177	91	87	94	▽▽
肥満者	35,783	9,856	9,959.5	99.0	97.5	100.4	▽
高血圧症有病者	35,786	12,674	12,833.2	98.8	97.6	100.0	▽▽
高血圧症予備群	34,105	4,287	4,568.2	93.8	91.6	96.2	▽▽
糖尿病有病者	35,786	2,274	2,320.0	98.0	94.7	101.5	▽
糖尿病予備群	29,906	4,755	4,126.3	115.2	112.7	117.8	▲▲
脂質異常症有病者	35,786	18,460	18,628.6	99.1	98.2	100.0	▽▽
習慣的喫煙者	35,786	3,083	3,093.9	99.6	96.8	102.6	▽
習慣的飲酒者	33,883	3,471	3,506.2	99.0	96.3	101.8	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 糖尿病予備群,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 高血圧症有病者, 高血圧症予備群, 脂質異常症有病者。

2)


収縮期血圧高値	34,108	12,007	12,754.2	94.1	93.0	95.3	▽▽
拡張期血圧高値	34,105	5,169	5,116.1	101.0	98.8	103.3	▲
血圧高値	34,108	12,885	13,484.1	95.6	94.4	96.7	▽▽
空腹時血糖高値	25,539	6,854	7,155.4	95.8	94.1	97.5	▽▽
HbA1c高値	24,602	13,396	12,001.8	111.6	110.5	112.7	▲▲
血糖高値	29,906	15,717	14,560.7	107.9	106.9	109.0	▲▲
中性脂肪高値	35,737	4,503	4,598.7	97.9	95.6	100.3	▽
HDL-C低値	35,740	603	682.6	88.3	82.3	94.8	▽▽
LDL-C高値	35,712	19,736	19,941.9	99.0	98.2	99.8	▽▽
脂質異常	35,740	21,435	21,655.9	99.0	98.3	99.7	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 空腹時血糖高値, HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常。

県南(平成26年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	10,209	2,608	2,705.7	96.4	93.4	99.5	▽▽
メタボ予備群	10,209	1,670	1,839.0	90.8	87.0	94.7	▽▽
肥満者	10,221	5,196	5,416.8	95.9	94.2	97.7	▽▽
高血圧症有病者	10,222	4,713	5,043.6	93.4	91.6	95.4	▽▽
高血圧症予備群	10,126	1,474	1,479.7	99.6	95.2	104.3	▽
糖尿病有病者	10,222	1,462	1,368.2	106.9	102.1	111.8	▲▲
糖尿病予備群	9,365	1,438	1,404.3	102.4	97.8	107.2	▲
脂質異常症有病者	10,222	5,499	5,637.7	97.5	95.9	99.2	▽▽
習慣的喫煙者	10,222	3,624	3,517.6	103.0	100.5	105.7	▲▲
習慣的飲酒者	10,057	4,741	4,700.0	100.9	98.9	102.9	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 糖尿病有病者, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 肥満者, 高血圧症有病者, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	10126	4,707	4,919.9	95.7	93.8	97.6	▽▽
拡張期血圧高値	10,126	2,397	2,816.1	85.1	82.3	88.1	▽▽
血圧高値	10,126	5,035	5,327.3	94.5	92.7	96.3	▽▽
空腹時血糖高値	7,941	4,129	3,759.6	109.8	107.6	112.1	▲▲
HbA1c高値	7,010	3,385	3,359.6	100.8	98.4	103.1	▲
血糖高値	9,365	5,571	5,187.1	107.4	105.7	109.1	▲▲
中性脂肪高値	10,191	2,710	2,792.1	97.1	94.1	100.1	▽
HDL-C低値	10,195	822	911.9	90.1	84.6	96.0	▽▽
LDL-C高値	10,194	5,035	5,189.7	97.0	95.2	98.9	▽▽
脂質異常	10,200	6,432	6,600.6	97.4	96.1	98.9	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 空腹時血糖高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値, HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常,

県南(平成26年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	10,540	926	1,014.1	91.3	86.0	96.9	▽▽
メタボ予備群	10,540	551	649	85	79	92	▽▽
肥満者	10,544	3,048	2,969.5	102.6	99.7	105.6	▲
高血圧症有病者	10,545	3,830	3,923.7	97.6	95.3	100.0	▽
高血圧症予備群	10,513	1,249	1,423.7	87.7	83.4	92.3	▽▽
糖尿病有病者	10,545	793	714.5	111.0	104.1	118.3	▲▲
糖尿病予備群	10,022	1,428	1,380.8	103.4	98.8	108.3	▲
脂質異常症有病者	10,545	5,549	5,643.2	98.3	96.6	100.1	▽
習慣的喫煙者	10,545	834	863.5	96.6	90.7	102.9	▽
習慣的飲酒者	10,418	851	1,057.5	80.5	75.6	85.7	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 糖尿病有病者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 高血圧症予備群, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	10,515	3,794	4,027.8	94.2	91.9	96.5	▽▽
拡張期血圧高値	10,515	1,277	1,590.9	80.3	76.4	84.4	▽▽
血圧高値	10,515	3,988	4,250.1	93.8	91.6	96.1	▽▽
空腹時血糖高値	9,027	2,845	2,534.7	112.2	109.0	115.5	▲▲
HbA1c高値	7,932	4,220	3,892.7	108.4	106.3	110.6	▲▲
血糖高値	10,024	5,282	4,877.5	108.3	106.4	110.2	▲▲
中性脂肪高値	10,527	1,369	1,386.6	98.7	94.1	103.6	▽
HDL-C低値	10,534	173	203.1	85.2	73.8	98.3	▽▽
LDL-C高値	10,534	5,825	5,953.0	97.8	96.2	99.5	▽▽
脂質異常	10,539	6,365	6,467.2	98.4	97.0	99.9	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値, HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常,

会津(平成26年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	21,370	5,536	5,594.5	99.0	96.9	101.1	▽
メタボ予備群	21,370	3,873	3,866.7	100.2	97.6	102.8	▲
肥満者	21,396	11,341	11,327.1	100.1	99.0	101.3	▲
高血圧症有病者	21,400	10,415	10,359.2	100.5	99.3	101.8	▲
高血圧症予備群	21,321	3,260	3,144.1	103.7	100.7	106.8	▲▲
糖尿病有病者	21,400	2,570	2,787.2	92.2	89.2	95.4	▽▽
糖尿病予備群	16,743	2,377	2,521.9	94.3	91.0	97.6	▽▽
脂質異常症有病者	21,400	11,790	11,842.0	99.6	98.5	100.7	▽
習慣的喫煙者	21,400	7,941	7,543.3	105.3	103.6	107.0	▲▲
習慣的飲酒者	20,725	9,987	9,633.3	103.7	102.3	105.0	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症予備群, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病有病者, 糖尿病予備群,

2)


収縮期血圧高値	21321	10,975	10,238.4	107.2	105.9	108.5	▲▲
拡張期血圧高値	21,321	6,035	6,034.5	100.0	98.1	102.0	▲
血圧高値	21,321	11,671	11,130.9	104.9	103.7	106.0	▲▲
空腹時血糖高値	13,279	6,120	6,375.4	96.0	94.4	97.6	▽▽
HbA1c高値	14,354	6,187	6,787.0	91.2	89.6	92.7	▽▽
血糖高値	16,743	8,861	9,300.9	95.3	94.0	96.5	▽▽
中性脂肪高値	21,336	6,204	5,914.2	104.9	102.9	107.0	▲▲
HDL-C低値	21,338	2,106	1,907.9	110.4	106.3	114.6	▲▲
LDL-C高値	21,334	10,738	10,955.1	98.0	96.8	99.2	▽▽
脂質異常	21,339	13,954	13,896.2	100.4	99.5	101.3	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値,
- ・有意に低い(▽▽) ... LDL-C高値, 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,

会津(平成26年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	23,027	2,128	2,167.3	98.2	94.6	101.9	▽
メタボ予備群	23,027	1,361	1,412	96	92	101	▽
肥満者	23,036	6,389	6,449.6	99.1	97.2	101.0	▽
高血圧症有病者	23,042	8,255	8,408.4	98.2	96.6	99.7	▽▽
高血圧症予備群	22,813	3,258	3,071.9	106.1	103.0	109.2	▲▲
糖尿病有病者	23,042	1,293	1,520.3	85.0	81.0	89.3	▽▽
糖尿病予備群	19,104	2,282	2,689.8	84.8	81.9	87.9	▽▽
脂質異常症有病者	23,042	11,653	12,134.7	96.0	94.9	97.2	▽▽
習慣的喫煙者	23,042	2,088	1,945.5	107.3	103.4	111.4	▲▲
習慣的飲酒者	22,523	2,501	2,319.9	107.8	104.2	111.5	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症予備群, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	22,815	9,199	8,616.5	106.8	105.2	108.3	▲▲
拡張期血圧高値	22,814	3,411	3,442.7	99.1	96.3	101.9	▽
血圧高値	22,816	9,580	9,104.4	105.2	103.8	106.7	▲▲
空腹時血糖高値	16,442	4,480	4,802.8	93.3	91.2	95.4	▽▽
HbA1c高値	17,117	7,254	8,284.3	87.6	86.2	89.0	▽▽
血糖高値	19,104	8,801	9,451.2	93.1	91.8	94.4	▽▽
中性脂肪高値	22,945	2,757	2,980.0	92.5	89.6	95.6	▽▽
HDL-C低値	22,945	411	440.4	93.3	85.4	102.0	▽
LDL-C高値	22,945	12,744	12,881.4	98.9	97.9	100.0	▽▽
脂質異常	22,945	13,817	13,982.2	98.8	97.9	99.8	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値, 中性脂肪高値, LDL-C高値, 脂質異常,

南会津(平成26年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	3,226	842	851.0	98.9	93.4	104.8	▽
メタボ予備群	3,226	612	582.6	105.0	97.9	112.7	▲
肥満者	3,226	1,726	1,709.6	101.0	97.8	104.2	▲
高血圧症有病者	3,226	1,638	1,579.9	103.7	100.2	107.2	▲▲
高血圧症予備群	3,223	562	473.6	118.7	110.2	127.8	▲▲
糖尿病有病者	3,226	319	426.0	74.9	67.5	83.0	▽▽
糖尿病予備群	2,545	273	388.3	70.3	62.9	78.6	▽▽
脂質異常症有病者	3,226	1,794	1,784.3	100.5	97.5	103.7	▲
習慣的喫煙者	3,226	1,277	1,122.2	113.8	109.1	118.7	▲▲
習慣的飲酒者	2,943	1,511	1,370.9	110.2	106.5	114.1	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症有病者, 高血圧症予備群, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病有病者, 糖尿病予備群,

2)


収縮期血圧高値	3223	1,859	1,558.1	119.3	115.9	122.9	▲▲
拡張期血圧高値	3,223	1,133	908.0	124.8	119.1	130.7	▲▲
血圧高値	3,223	1,988	1,691.4	117.5	114.4	120.7	▲▲
空腹時血糖高値	1,789	773	865.6	89.3	84.7	94.1	▽▽
HbA1c高値	2,287	857	1,085.0	79.0	75.0	83.2	▽▽
血糖高値	2,545	1,211	1,426.1	84.9	81.6	88.4	▽▽
中性脂肪高値	3,219	916	887.9	103.2	97.7	108.9	▲
HDL-C低値	3,223	286	288.1	99.3	89.0	110.7	▽
LDL-C高値	3,223	1,606	1,648.3	97.4	94.2	100.8	▽
脂質異常	3,223	2,068	2,093.0	98.8	96.3	101.4	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,

南会津(平成26年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	2,904	279	287.3	97.1	87.0	108.5	▽
メタボ予備群	2,904	165	180	92	79	106	▽
肥満者	2,905	905	826.0	109.6	103.9	115.6	▲▲
高血圧症有病者	2,905	1,238	1,112.9	111.2	106.7	116.0	▲▲
高血圧症予備群	2,904	468	393.0	119.1	109.7	129.2	▲▲
糖尿病有病者	2,905	170	202.4	84.0	72.7	97.0	▽▽
糖尿病予備群	2,488	266	362.2	73.4	65.6	82.2	▽▽
脂質異常症有病者	2,905	1,478	1,570.3	94.1	90.8	97.5	▽▽
習慣の喫煙者	2,905	242	230.0	105.2	93.4	118.6	▲
習慣の飲酒者	2,645	283	258.8	109.4	98.1	122.0	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 肥満者, 高血圧症有病者, 高血圧症予備群,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病有病者, 糖尿病予備群, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	2,904	1,483	1,133.4	130.8	126.3	135.5	▲▲
拡張期血圧高値	2,904	619	436.2	141.9	132.5	152.0	▲▲
血圧高値	2,904	1,529	1,193.5	128.1	123.8	132.6	▲▲
空腹時血糖高値	2,146	613	635.9	96.4	90.2	103.0	▽
HbA1c高値	2,253	932	1,115.6	83.5	79.6	87.7	▽▽
血糖高値	2,488	1,155	1,262.6	91.5	87.7	95.4	▽▽
中性脂肪高値	2,903	284	384.3	73.9	66.2	82.5	▽▽
HDL-C低値	2,903	34	57.1	59.5	42.7	82.9	▽▽
LDL-C高値	2,903	1,496	1,636.0	91.4	88.3	94.7	▽▽
脂質異常	2,903	1,619	1,779.8	91.0	88.1	93.9	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... HbA1c高値, 血糖高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常,

相双(平成26年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						結果
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		
					下限値	上限値	
メタボ該当者	12,287	3,875	3,303.4	117.3	114.4	120.3	▲▲
メタボ予備群	12,287	2,300	2,205.3	104.3	100.7	108.0	▲▲
肥満者	12,289	7,246	6,526.6	111.0	109.5	112.6	▲▲
高血圧症有病者	12,291	6,422	6,190.1	103.7	102.1	105.4	▲▲
高血圧症予備群	12,215	1,706	1,773.2	96.2	92.2	100.4	▽
糖尿病有病者	12,291	1,977	1,692.4	116.8	112.4	121.4	▲▲
糖尿病予備群	11,269	1,582	1,726.0	91.7	87.7	95.7	▽▽
脂質異常症有病者	12,291	7,261	6,769.6	107.3	105.8	108.8	▲▲
習慣的喫煙者	12,291	4,371	4,138.4	105.6	103.2	108.1	▲▲
習慣的飲酒者	10,601	5,064	5,006.2	101.2	99.2	103.1	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 肥満者, 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病予備群,

2)


収縮期血圧高値	12219	6,176	6,011.0	102.7	101.0	104.5	▲▲
拡張期血圧高値	12,217	3,393	3,373.3	100.6	97.9	103.4	▲
血圧高値	12,219	6,672	6,488.6	102.8	101.2	104.4	▲▲
空腹時血糖高値	9,325	4,908	4,452.9	110.2	108.2	112.3	▲▲
HbA1c高値	8,770	3,936	4,265.2	92.3	90.3	94.3	▽▽
血糖高値	11,271	6,511	6,341.2	102.7	101.1	104.2	▲▲
中性脂肪高値	12,279	3,675	3,334.0	110.2	107.4	113.1	▲▲
HDL-C低値	12,279	1,086	1,096.6	99.0	93.8	104.6	▽
LDL-C高値	12,271	6,495	6,203.0	104.7	103.0	106.4	▲▲
脂質異常	12,279	8,249	7,908.9	104.3	103.1	105.5	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値, LDL-C高値, 脂質異常, 空腹時血糖高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... HbA1c高値,

相双(平成26年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	13,349	1,570	1,317.5	119.2	114.1	124.5	▲▲
メタボ予備群	13,349	889	827	108	101	114	▲▲
肥満者	13,355	4,371	3,792.7	115.2	112.6	117.9	▲▲
高血圧症有病者	13,357	5,196	5,092.3	102.0	100.0	104.1	▲
高血圧症予備群	13,315	1,847	1,816.9	101.7	97.6	105.8	▲
糖尿病有病者	13,357	1,119	931.9	120.1	113.9	126.6	▲▲
糖尿病予備群	12,482	1,572	1,771.9	88.7	84.9	92.7	▽▽
脂質異常症有病者	13,357	7,941	7,276.4	109.1	107.7	110.6	▲▲
習慣の喫煙者	13,357	1,012	1,051.1	96.3	91.0	101.9	▽
習慣の飲酒者	11,796	987	1,155.3	85.4	80.7	90.5	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 肥満者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病予備群, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	13,318	5,254	5,196.1	101.1	99.1	103.2	▲
拡張期血圧高値	13,316	1,895	2,022.5	93.7	90.0	97.5	▽▽
血圧高値	13,318	5,555	5,474.2	101.5	99.6	103.4	▲
空腹時血糖高値	10,455	3,351	3,003.7	111.6	108.7	114.5	▲▲
HbA1c高値	11,002	4,912	5,382.0	91.3	89.5	93.1	▽▽
血糖高値	12,485	6,117	6,215.4	98.4	96.8	100.1	▽
中性脂肪高値	13,333	2,025	1,783.0	113.6	109.3	118.0	▲▲
HDL-C低値	13,335	305	259.2	117.7	105.9	130.7	▲▲
LDL-C高値	13,332	7,811	7,587.7	102.9	101.5	104.4	▲▲
脂質異常	13,335	8,592	8,246.6	104.2	102.9	105.5	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 空腹時血糖高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, HbA1c高値,

いわき(平成26年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	21,713	5,468	5,551.6	98.5	96.4	100.6	▽
メタボ予備群	21,713	4,368	3,950.5	110.6	107.9	113.3	▲▲
肥満者	21,732	12,030	11,465.8	104.9	103.8	106.1	▲▲
高血圧症有病者	21,733	10,285	10,167.6	101.2	99.9	102.5	▲
高血圧症予備群	20,929	3,066	3,112.0	98.5	95.6	101.6	▽
糖尿病有病者	21,733	2,621	2,704.1	96.9	93.7	100.2	▽
糖尿病予備群	13,467	1,733	2,000.9	86.6	83.1	90.3	▽▽
脂質異常症有病者	21,733	12,013	12,040.4	99.8	98.7	100.9	▽
習慣的喫煙者	21,733	8,023	7,890.2	101.7	100.1	103.3	▲▲
習慣的飲酒者	15,661	7,013	7,227.5	97.0	95.5	98.6	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ予備群, 肥満者, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病予備群, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	20930	9,780	9,851.1	99.3	98.0	100.6	▽
拡張期血圧高値	20,929	5,555	5,945.1	93.4	91.5	95.4	▽▽
血圧高値	20,930	10,630	10,757.6	98.8	97.6	100.0	▽
空腹時血糖高値	3,668	1,707	1,590.1	107.4	103.8	111.1	▲▲
HbA1c高値	10,956	5,545	5,173.6	107.2	105.3	109.1	▲▲
血糖高値	13,467	6,930	7,400.0	93.6	92.2	95.1	▽▽
中性脂肪高値	20,419	5,836	5,703.8	102.3	100.3	104.4	▲▲
HDL-C低値	20,419	1,855	1,832.8	101.2	97.2	105.4	▲
LDL-C高値	20,360	10,866	10,517.6	103.3	102.1	104.6	▲▲
脂質異常	20,421	13,587	13,348.3	101.8	100.9	102.7	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 中性脂肪高値, LDL-C高値, 脂質異常, 空腹時血糖高値, HbA1c高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, 血糖高値,

いわき(平成26年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	20,315	1,877	1,903.3	98.6	94.7	102.7	▽
メタボ予備群	20,315	1,407	1,240	114	108	119	▲▲
肥満者	20,315	5,861	5,675.6	103.3	101.2	105.4	▲▲
高血圧症有病者	20,317	7,486	7,375.4	101.5	99.8	103.2	▲
高血圧症予備群	19,841	2,551	2,658.0	96.0	92.8	99.3	▽▽
糖尿病有病者	20,317	1,241	1,333.8	93.0	88.5	97.9	▽▽
糖尿病予備群	15,253	1,940	2,160.9	89.8	86.3	93.4	▽▽
脂質異常症有病者	20,317	10,739	10,619.0	101.1	99.9	102.4	▲
習慣の喫煙者	20,317	2,156	1,734.6	124.3	119.8	128.9	▲▲
習慣の飲酒者	16,508	1,710	1,623.7	105.3	101.0	109.9	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ予備群, 肥満者, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 高血圧症予備群, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群,

2)

収縮期血圧高値	19,841	7,285	7,479.4	97.4	95.8	99.1	▽▽
拡張期血圧高値	19,841	2,664	2,968.9	89.7	86.8	92.7	▽▽
血圧高値	19,841	7,659	7,900.5	96.9	95.4	98.5	▽▽
空腹時血糖高値	3,067	741	687.9	107.7	101.3	114.6	▲▲
HbA1c高値	13,434	6,586	6,550.1	100.5	98.9	102.2	▲
血糖高値	15,255	7,120	7,577.6	94.0	92.5	95.5	▽▽
中性脂肪高値	19,524	2,653	2,533.1	104.7	101.3	108.2	▲▲
HDL-C低値	19,524	353	378.5	93.3	84.6	102.7	▽
LDL-C高値	19,513	11,077	10,900.6	101.6	100.5	102.8	▲▲
脂質異常	19,524	12,030	11,850.8	101.5	100.5	102.6	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 空腹時血糖高値, 中性脂肪高値, LDL-C高値, 脂質異常,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値, 血糖高値,