

## ■ ■ 二次医療圏標準化該当比 ■ ■

【県北】 福島市・二本松市・本宮市・伊達市・川俣町・桑折町・国見町・大玉村

【県中】 郡山市・須賀川市・田村市・鏡石町・天栄村・石川町・玉川村・平田村・  
浅川町・古殿町・三春町・小野町

【県南】 白河市・棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町

【会津】 会津若松市・喜多方市・磐梯町・猪苗代町・北塩原村・西会津町・  
会津坂下町・湯川村・柳津町・会津美里町・三島町・金山町・昭和村


【南会津】 南会津町・下郷町・只見町・桧枝岐村

【相双】 相馬市・南相馬市・広野町・富岡町・楡葉町・川内村・大熊町・双葉町・  
浪江町・葛尾村・新地町・飯舘村

【いわき】 いわき市

県北(平成27年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	44,949	10,382	11,395.8	91.1	89.8	92.4	▽▽
メタボ予備群	44,949	7,821	8,033.5	97.4	95.7	99.0	▽▽
肥満者	44,975	23,764	24,008.7	99.0	98.3	99.7	▽▽
高血圧症有病者	44,993	20,314	20,624.0	98.5	97.7	99.3	▽▽
高血圧症予備群	42,310	6,002	6,249.4	96.0	94.2	98.0	▽▽
糖尿病有病者	44,993	5,313	5,688.5	93.4	91.4	95.4	▽▽
糖尿病予備群	37,925	5,233	5,563.6	94.1	92.1	96.1	▽▽
脂質異常症有病者	44,993	24,896	24,995.0	99.6	98.9	100.3	▽
習慣的喫煙者	44,993	15,030	16,535.4	90.9	89.9	91.9	▽▽
習慣的飲酒者	44,567	20,075	20,226.4	99.3	98.4	100.1	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ...
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 肥満者, 高血圧症有病者, 高血圧症予備群, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群, 習慣的喫煙者,

2)


収縮期血圧高値	42312	18,898	19,354.9	97.6	96.8	98.5	▽▽
拡張期血圧高値	42,311	12,208	11,970.8	102.0	100.7	103.3	▲▲
血圧高値	42,313	20,857	21,234.4	98.2	97.4	99.0	▽▽
空腹時血糖高値	26,175	11,174	11,827.4	94.5	93.4	95.6	▽▽
HbA1c高値	26,457	13,144	13,081.6	100.5	99.4	101.5	▲
血糖高値	37,925	19,840	20,597.2	96.3	95.6	97.1	▽▽
中性脂肪高値	44,748	12,337	12,647.4	97.5	96.3	98.8	▽▽
HDL-C低値	44,770	3,800	4,073.0	93.3	90.9	95.7	▽▽
LDL-C高値	44,767	23,516	23,295.7	100.9	100.2	101.7	▲▲
脂質異常	44,772	29,415	29,470.8	99.8	99.3	100.4	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 拡張期血圧高値, LDL-C高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値, 空腹時血糖高値, 血糖高値,

県北(平成27年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	45,764	3,590	3,944.2	91.0	88.6	93.5	▽▽
メタボ予備群	45,764	2,623	2,770	95	92	98	▽▽
肥満者	45,791	12,623	12,754.0	99.0	97.7	100.2	▽
高血圧症有病者	45,826	14,854	15,296.9	97.1	96.0	98.2	▽▽
高血圧症予備群	42,076	5,411	5,519.8	98.0	96.0	100.1	▽
糖尿病有病者	45,826	2,612	2,875.7	90.8	88.0	93.8	▽▽
糖尿病予備群	40,201	5,175	5,387.2	96.1	94.0	98.2	▽▽
脂質異常症有病者	45,826	23,135	23,034.8	100.4	99.7	101.2	▲
習慣的喫煙者	45,826	3,308	4,372.6	75.7	73.5	77.8	▽▽
習慣的飲酒者	45,398	4,849	5,077.9	95.5	93.4	97.6	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ...
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	42,078	14,336	14,620.6	98.1	97.0	99.2	▽▽
拡張期血圧高値	42,077	6,541	6,293.3	103.9	102.0	105.9	▲▲
血圧高値	42,079	15,339	15,574.4	98.5	97.4	99.5	▽▽
空腹時血糖高値	26,874	6,704	7,191.0	93.2	91.6	94.9	▽▽
HbA1c高値	31,644	15,577	15,446.1	100.8	99.9	101.8	▲
血糖高値	40,201	18,441	18,955.2	97.3	96.4	98.2	▽▽
中性脂肪高値	45,547	5,529	5,647.2	97.9	95.9	100.0	▽▽
HDL-C低値	45,585	700	834.8	83.9	78.7	89.4	▽▽
LDL-C高値	45,584	25,500	25,152.0	101.4	100.7	102.1	▲▲
脂質異常	45,585	27,424	27,221.0	100.7	100.1	101.4	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 拡張期血圧高値, LDL-C高値, 脂質異常,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 空腹時血糖高値, 血糖高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値,

県中(平成27年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	33,478	8,767	8,649.6	101.4	99.8	103.0	▲
メタボ予備群	33,478	5,833	5,962.5	97.8	95.8	99.9	▽▽
肥満者	33,500	17,622	17,903.6	98.4	97.5	99.3	▽▽
高血圧症有病者	33,505	15,854	15,803.9	100.3	99.3	101.3	▲
高血圧症予備群	32,193	4,599	4,684.7	98.2	95.9	100.5	▽
糖尿病有病者	33,505	4,382	4,412.4	99.3	96.9	101.8	▽
糖尿病予備群	26,419	4,331	4,029.2	107.5	105.0	110.1	▲▲
脂質異常症有病者	33,505	18,280	18,545.3	98.6	97.7	99.4	▽▽
習慣的喫煙者	33,505	12,404	11,937.4	103.9	102.6	105.2	▲▲
習慣的飲酒者	30,159	13,882	13,854.8	100.2	99.1	101.3	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 糖尿病予備群, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ予備群, 肥満者, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	32193	14,865	15,101.4	98.4	97.4	99.5	▽▽
拡張期血圧高値	32,194	9,278	8,845.3	104.9	103.3	106.5	▲▲
血圧高値	32,194	16,375	16,433.9	99.6	98.7	100.6	▽
空腹時血糖高値	21,483	10,105	10,046.6	100.6	99.3	101.8	▲
HbA1c高値	19,533	10,198	9,987.2	102.1	100.9	103.3	▲▲
血糖高値	26,419	15,313	14,762.2	103.7	102.8	104.7	▲▲
中性脂肪高値	33,271	9,221	9,248.3	99.7	98.2	101.2	▽
HDL-C低値	33,291	3,028	3,025.2	100.1	97.1	103.1	▲
LDL-C高値	33,247	16,612	17,088.8	97.2	96.3	98.1	▽▽
脂質異常	33,292	21,292	21,717.4	98.0	97.3	98.7	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 拡張期血圧高値, HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, LDL-C高値, 脂質異常,

県中(平成27年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	34,868	3,140	3,237.8	97.0	94.2	99.9	▽▽
メタボ予備群	34,868	1,981	2,136	93	89	96	▽▽
肥満者	34,883	9,674	9,875.2	98.0	96.5	99.4	▽▽
高血圧症有病者	34,886	12,369	12,485.0	99.1	97.8	100.3	▽
高血圧症予備群	32,381	4,247	4,349.2	97.7	95.3	100.1	▽
糖尿病有病者	34,886	2,324	2,381.1	97.6	94.3	101.0	▽
糖尿病予備群	28,668	4,749	4,241.1	112.0	109.5	114.5	▲▲
脂質異常症有病者	34,886	18,073	18,325.9	98.6	97.7	99.5	▽▽
習慣的喫煙者	34,886	3,295	3,052.3	107.9	104.9	111.1	▲▲
習慣的飲酒者	32,367	3,412	3,410.8	100.0	97.3	102.9	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 糖尿病予備群, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 肥満者, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	32,383	11,767	12,110.0	97.2	95.9	98.4	▽▽
拡張期血圧高値	32,381	4,910	4,860.4	101.0	98.8	103.3	▲
血圧高値	32,383	12,578	12,801.6	98.3	97.1	99.4	▽▽
空腹時血糖高値	23,072	6,676	6,857.7	97.4	95.7	99.1	▽▽
HbA1c高値	24,344	13,115	12,514.0	104.8	103.7	105.9	▲▲
血糖高値	28,668	15,327	14,562.7	105.2	104.2	106.3	▲▲
中性脂肪高値	34,536	4,532	4,441.5	102.0	99.6	104.5	▲
HDL-C低値	34,544	583	649.1	89.8	83.6	96.5	▽▽
LDL-C高値	34,491	18,734	19,279.3	97.2	96.3	98.0	▽▽
脂質異常	34,546	20,489	20,950.3	97.8	97.1	98.6	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 空腹時血糖高値, HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常,

県南(平成27年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	9,935	2,576	2,639.8	97.6	94.5	100.8	▽
メタボ予備群	9,935	1,660	1,763.7	94.1	90.2	98.2	▽▽
肥満者	9,944	5,134	5,333.8	96.3	94.5	98.0	▽▽
高血圧症有病者	9,946	4,607	4,874.5	94.5	92.6	96.5	▽▽
高血圧症予備群	9,702	1,524	1,399.4	108.9	104.2	113.9	▲▲
糖尿病有病者	9,946	1,473	1,379.7	106.8	102.0	111.7	▲▲
糖尿病予備群	9,117	1,487	1,411.9	105.3	100.7	110.1	▲▲
脂質異常症有病者	9,946	5,461	5,503.2	99.2	97.5	101.0	▽
習慣的喫煙者	9,946	3,661	3,422.3	107.0	104.3	109.7	▲▲
習慣的飲酒者	9,759	4,528	4,539.7	99.7	97.7	101.8	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症予備群, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ予備群, 肥満者, 高血圧症有病者,

2)


収縮期血圧高値	9702	4,667	4,668.8	100.0	98.0	102.0	▽
拡張期血圧高値	9,702	2,349	2,650.3	88.6	85.7	91.7	▽▽
血圧高値	9,702	4,979	5,051.7	98.6	96.7	100.4	▽
空腹時血糖高値	7,593	3,983	3,617.0	110.1	107.9	112.4	▲▲
HbA1c高値	6,853	3,603	3,511.0	102.6	100.4	104.9	▲▲
血糖高値	9,117	5,584	5,153.9	108.3	106.7	110.1	▲▲
中性脂肪高値	9,898	2,675	2,714.5	98.5	95.5	101.7	▽
HDL-C低値	9,911	827	894.9	92.4	86.8	98.4	▽▽
LDL-C高値	9,915	4,954	5,040.2	98.3	96.4	100.2	▽
脂質異常	9,919	6,327	6,425.3	98.5	97.1	99.9	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, HDL-C低値, 脂質異常,

県南(平成27年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	10,156	939	969.8	96.8	91.3	102.7	▽
メタボ予備群	10,156	485	627	77	71	84	▽▽
肥満者	10,157	2,841	2,893.0	98.2	95.3	101.2	▽
高血圧症有病者	10,159	3,656	3,729.5	98.0	95.6	100.5	▽
高血圧症予備群	9,912	1,280	1,346.3	95.1	90.5	99.9	▽▽
糖尿病有病者	10,159	774	714.9	108.3	101.4	115.6	▲▲
糖尿病予備群	9,567	1,472	1,391.5	105.8	101.1	110.7	▲▲
脂質異常症有病者	10,159	5,439	5,454.8	99.7	98.0	101.5	▽
習慣的喫煙者	10,159	890	854.0	104.2	98.1	110.7	▲
習慣的飲酒者	9,988	826	1,042.6	79.2	74.3	84.4	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 糖尿病有病者, 糖尿病予備群,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ予備群, 高血圧症予備群, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	9,914	3,793	3,770.2	100.6	98.2	103.1	▲
拡張期血圧高値	9,912	1,313	1,504.3	87.3	83.1	91.7	▽▽
血圧高値	9,914	3,933	3,981.1	98.8	96.5	101.1	▽
空腹時血糖高値	8,350	2,885	2,448.4	117.8	114.6	121.2	▲▲
HbA1c高値	7,531	4,173	3,897.0	107.1	105.0	109.2	▲▲
血糖高値	9,567	5,270	4,803.6	109.7	107.8	111.6	▲▲
中性脂肪高値	10,072	1,350	1,319.2	102.3	97.5	107.4	▲
HDL-C低値	10,093	176	190.1	92.6	80.3	106.7	▽
LDL-C高値	10,101	5,727	5,711.0	100.3	98.6	101.9	▲
脂質異常	10,103	6,244	6,197.3	100.8	99.3	102.3	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値,

# 会津(平成27年度)

## 標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	20,280	5,225	5,328.9	98.0	95.9	100.2	▽
メタボ予備群	20,280	3,579	3,607.8	99.2	96.5	102.0	▽
肥満者	20,288	10,638	10,873.7	97.8	96.6	99.0	▽▽
高血圧症有病者	20,290	9,757	9,779.2	99.8	98.5	101.1	▽
高血圧症予備群	19,185	2,867	2,793.0	102.6	99.5	105.9	▲
糖尿病有病者	20,290	2,542	2,748.9	92.5	89.4	95.7	▽▽
糖尿病予備群	14,992	2,296	2,346.2	97.9	94.5	101.4	▽
脂質異常症有病者	20,290	11,094	11,252.8	98.6	97.4	99.7	▽▽
習慣の喫煙者	20,290	7,672	7,126.3	107.7	105.9	109.4	▲▲
習慣の飲酒者	19,953	9,614	9,231.6	104.1	102.8	105.5	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 肥満者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,

2)

収縮期血圧高値	19186	9,506	9,096.5	104.5	103.1	105.9	▲▲
拡張期血圧高値	19,185	5,136	5,338.3	96.2	94.1	98.3	▽▽
血圧高値	19,186	10,102	9,889.3	102.2	100.9	103.4	▲▲
空腹時血糖高値	10,350	4,737	5,048.8	93.8	92.0	95.7	▽▽
HbA1c高値	13,563	6,475	6,841.2	94.6	93.1	96.2	▽▽
血糖高値	14,992	8,404	8,542.4	98.4	97.1	99.7	▽▽
中性脂肪高値	19,744	5,878	5,480.9	107.2	105.1	109.4	▲▲
HDL-C低値	19,743	1,818	1,783.0	102.0	97.9	106.2	▲
LDL-C高値	19,736	9,927	10,121.4	98.1	96.8	99.4	▽▽
脂質異常	19,746	13,001	12,873.9	101.0	100.0	101.9	▲▲


福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値, 脂質異常,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, LDL-C高値, 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,



# 会津(平成27年度)

## 標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	21,567	1,931	2,035.1	94.9	91.2	98.7	▽▽
メタボ予備群	21,567	1,321	1,330	99	95	104	▽
肥満者	21,576	5,983	6,132.9	97.6	95.6	99.5	▽▽
高血圧症有病者	21,582	7,714	7,849.4	98.3	96.7	99.9	▽▽
高血圧症予備群	20,183	2,777	2,723.3	102.0	98.8	105.3	▲
糖尿病有病者	21,582	1,306	1,497.6	87.2	83.0	91.6	▽▽
糖尿病予備群	17,284	2,327	2,609.4	89.2	86.1	92.4	▽▽
脂質異常症有病者	21,582	10,991	11,491.8	95.6	94.5	96.8	▽▽
習慣的喫煙者	21,582	2,193	1,842.7	119.0	114.8	123.4	▲▲
習慣的飲酒者	21,374	2,475	2,253.3	109.8	106.2	113.6	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, 肥満者, 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	20,184	7,750	7,547.0	102.7	101.0	104.4	▲▲
拡張期血圧高値	20,183	2,914	3,059.1	95.3	92.3	98.3	▽▽
血圧高値	20,184	8,085	7,983.1	101.3	99.7	102.9	▲
空腹時血糖高値	13,424	3,820	4,174.7	91.5	89.3	93.8	▽▽
HbA1c高値	15,937	7,473	8,142.8	91.8	90.4	93.2	▽▽
血糖高値	17,284	8,694	8,922.5	97.4	96.1	98.8	▽▽
中性脂肪高値	20,848	2,508	2,703.0	92.8	89.7	96.0	▽▽
HDL-C低値	20,849	408	390.6	104.5	95.6	114.2	▲
LDL-C高値	20,846	11,649	11,738.3	99.2	98.1	100.4	▽
脂質異常	20,850	12,655	12,732.2	99.4	98.4	100.4	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値, 中性脂肪高値,

# 南会津(平成27年度)

## 標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	2,887	712	762.3	93.4	87.7	99.5	▽▽
メタボ予備群	2,887	508	513.2	99.0	91.5	107.0	▽
肥満者	2,888	1,469	1,549.4	94.8	91.5	98.2	▽▽
高血圧症有病者	2,889	1,398	1,402.7	99.7	96.0	103.4	▽
高血圧症予備群	2,737	435	398.1	109.3	100.3	119.0	▲▲
糖尿病有病者	2,889	284	394.5	72.0	64.5	80.3	▽▽
糖尿病予備群	2,246	316	353.7	89.3	80.7	98.9	▽▽
脂質異常症有病者	2,889	1,608	1,603.6	100.3	97.1	103.6	▲
習慣的喫煙者	2,889	1,151	1,007.7	114.2	109.3	119.4	▲▲
習慣的飲酒者	2,764	1,419	1,278.9	111.0	107.0	115.0	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症予備群, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, 肥満者, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群,

2)


収縮期血圧高値	2737	1,453	1,303.5	111.5	107.6	115.4	▲▲
拡張期血圧高値	2,737	749	762.5	98.2	92.5	104.3	▽
血圧高値	2,737	1,532	1,416.5	108.2	104.7	111.8	▲▲
空腹時血糖高値	1,292	568	638.6	88.9	83.7	94.5	▽▽
HbA1c高値	2,130	1,038	1,073.3	96.7	92.6	101.0	▽
血糖高値	2,246	1,280	1,285.5	99.6	96.1	103.2	▽
中性脂肪高値	2,877	834	796.5	104.7	98.9	110.8	▲
HDL-C低値	2,879	219	260.4	84.1	74.1	95.4	▽▽
LDL-C高値	2,879	1,376	1,472.0	93.5	90.0	97.1	▽▽
脂質異常	2,879	1,814	1,873.6	96.8	94.2	99.5	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常, 空腹時血糖高値,

南会津(平成27年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	2,651	223	262.0	85.1	75.1	96.4	▽▽
メタボ予備群	2,651	113	165	69	57	82	▽▽
肥満者	2,650	780	761.9	102.4	96.6	108.5	▲
高血圧症有病者	2,651	1,045	1,009.6	103.5	98.8	108.5	▲
高血圧症予備群	2,518	346	343.4	100.8	91.4	111.0	▲
糖尿病有病者	2,651	154	193.6	79.5	68.3	92.6	▽▽
糖尿病予備群	2,239	322	349.1	92.2	83.4	102.0	▽
脂質異常症有病者	2,651	1,358	1,448.1	93.8	90.4	97.3	▽▽
習慣的喫煙者	2,651	241	212.4	113.5	100.7	127.8	▲▲
習慣的飲酒者	2,549	319	258.9	123.2	111.3	136.4	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	2,518	1,111	981.2	113.2	108.4	118.3	▲▲
拡張期血圧高値	2,518	356	381.0	93.4	84.9	102.8	▽
血圧高値	2,518	1,135	1,033.6	109.8	105.2	114.6	▲▲
空腹時血糖高値	1,790	556	568.6	97.8	91.3	104.7	▽
HbA1c高値	2,106	1,024	1,094.1	93.6	89.6	97.8	▽▽
血糖高値	2,239	1,170	1,184.2	98.8	95.0	102.8	▽
中性脂肪高値	2,625	279	348.4	80.1	71.7	89.4	▽▽
HDL-C低値	2,625	26	50.2	51.8	35.4	75.8	▽▽
LDL-C高値	2,625	1,401	1,486.4	94.3	91.0	97.7	▽▽
脂質異常	2,625	1,516	1,615.7	93.8	90.8	96.9	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... HbA1c高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常,

# 相双(平成27年度)

## 標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	12,274	3,918	3,308.2	118.4	115.6	121.4	▲▲
メタボ予備群	12,274	2,196	2,175.1	101.0	97.4	104.7	▲
肥満者	12,276	7,215	6,597.3	109.4	107.8	110.9	▲▲
高血圧症有病者	12,280	6,503	6,136.0	106.0	104.3	107.7	▲▲
高血圧症予備群	11,573	1,537	1,662.3	92.5	88.4	96.7	▽▽
糖尿病有病者	12,280	2,004	1,747.9	114.7	110.4	119.1	▲▲
糖尿病予備群	11,127	1,718	1,760.6	97.6	93.6	101.7	▽
脂質異常症有病者	12,280	7,317	6,793.2	107.7	106.2	109.2	▲▲
習慣的喫煙者	12,279	4,385	4,144.3	105.8	103.4	108.2	▲▲
習慣的飲酒者	11,179	5,329	5,240.6	101.7	99.8	103.6	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ該当者, 肥満者, 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 高血圧症予備群,

2)


収縮期血圧高値	11,575	5,974	5,632.0	106.1	104.3	107.9	▲▲
拡張期血圧高値	11,573	3,312	3,152.2	105.1	102.2	108.0	▲▲
血圧高値	11,575	6,441	6,079.5	105.9	104.3	107.6	▲▲
空腹時血糖高値	8,585	4,558	4,125.0	110.5	108.4	112.6	▲▲
HbA1c高値	8,806	4,414	4,562.4	96.7	94.8	98.7	▽▽
血糖高値	11,127	6,670	6,393.4	104.3	102.8	105.9	▲▲
中性脂肪高値	12,078	3,572	3,289.8	108.6	105.8	111.5	▲▲
HDL-C低値	12,080	1,096	1,087.5	100.8	95.5	106.4	▲
LDL-C高値	12,073	6,358	6,101.0	104.2	102.5	105.9	▲▲
脂質異常	12,080	8,092	7,795.9	103.8	102.6	105.1	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値, LDL-C高値, 脂質異常, 空腹時血糖高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... HbA1c高値,

相双(平成27年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	13,286	1,564	1,298.0	120.5	115.3	125.9	▲▲
メタボ予備群	13,286	864	825	105	98	111	▲
肥満者	13,287	4,278	3,806.0	112.4	109.8	115.1	▲▲
高血圧症有病者	13,288	5,183	4,986.3	103.9	101.9	106.1	▲▲
高血圧症予備群	12,599	1,691	1,724.9	98.0	94.0	102.3	▽
糖尿病有病者	13,288	1,124	958.9	117.2	111.2	123.6	▲▲
糖尿病予備群	12,243	1,709	1,832.9	93.2	89.4	97.2	▽▽
脂質異常症有病者	13,288	7,949	7,255.6	109.6	108.1	111.0	▲▲
習慣的喫煙者	13,288	1,102	1,078.8	102.1	96.8	107.8	▲
習慣的飲酒者	12,100	1,045	1,233.0	84.8	80.1	89.6	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ該当者, 肥満者, 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病予備群, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	12,599	5,044	4,869.6	103.6	101.5	105.7	▲▲
拡張期血圧高値	12,599	1,912	1,922.9	99.4	95.6	103.4	▽
血圧高値	12,599	5,335	5,135.4	103.9	101.9	105.9	▲▲
空腹時血糖高値	9,767	3,220	2,932.1	109.8	106.9	112.8	▲▲
HbA1c高値	10,831	5,256	5,565.4	94.4	92.7	96.2	▽▽
血糖高値	12,243	6,344	6,288.2	100.9	99.3	102.5	▲
中性脂肪高値	12,993	1,933	1,727.4	111.9	107.6	116.4	▲▲
HDL-C低値	12,994	256	246.0	104.1	92.7	116.8	▲
LDL-C高値	12,992	7,627	7,405.8	103.0	101.6	104.4	▲▲
脂質異常	12,995	8,367	8,039.8	104.1	102.8	105.4	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 空腹時血糖高値, 中性脂肪高値, LDL-C高値, 脂質異常,
- ・有意に低い(▽▽) ... HbA1c高値,

いわき(平成27年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	21,680	5,606	5,526.2	101.4	99.3	103.6	▲
メタボ予備群	21,680	4,129	3,869.8	106.7	104.0	109.4	▲▲
肥満者	21,680	11,953	11,572.3	103.3	102.1	104.4	▲▲
高血圧症有病者	21,684	10,134	10,027.4	101.1	99.7	102.4	▲
高血圧症予備群	20,495	2,989	2,996.3	99.8	96.7	102.9	▽
糖尿病有病者	21,684	2,783	2,779.7	100.1	96.9	103.4	▲
糖尿病予備群	14,861	1,994	2,244.0	88.9	85.5	92.3	▽▽
脂質異常症有病者	21,684	11,784	12,018.0	98.1	97.0	99.2	▽▽
習慣的喫煙者	21,684	8,243	7,885.2	104.5	102.9	106.2	▲▲
習慣的飲酒者	20,196	8,958	9,209.4	97.3	95.9	98.7	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ予備群, 肥満者, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病予備群, 脂質異常症有病者, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	20497	9,463	9,525.6	99.3	98.0	100.7	▽
拡張期血圧高値	20,495	5,214	5,676.8	91.8	89.9	93.9	▽▽
血圧高値	20,497	10,287	10,392.7	99.0	97.7	100.2	▽
空腹時血糖高値	5,288	2,311	2,257.3	102.4	99.4	105.5	▲
HbA1c高値	11,210	5,861	5,633.8	104.0	102.3	105.8	▲▲
血糖高値	14,861	7,731	8,240.6	93.8	92.5	95.2	▽▽
中性脂肪高値	20,268	5,791	5,658.6	102.3	100.3	104.4	▲▲
HDL-C低値	20,273	1,822	1,842.4	98.9	94.9	103.0	▽
LDL-C高値	20,182	10,641	10,406.0	102.3	101.0	103.5	▲▲
脂質異常	20,275	13,375	13,257.6	100.9	100.0	101.8	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 中性脂肪高値, LDL-C高値, HbA1c高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, 血糖高値,

いわき(平成27年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	20,570	1,887	1,913.2	98.6	94.8	102.7	▽
メタボ予備群	20,570	1,340	1,260	106	101	112	▲▲
肥満者	20,569	5,791	5,825.7	99.4	97.4	101.4	▽
高血圧症有病者	20,572	7,724	7,382.3	104.6	102.9	106.4	▲▲
高血圧症予備群	19,799	2,687	2,657.2	101.1	97.9	104.5	▲
糖尿病有病者	20,572	1,349	1,406.2	95.9	91.4	100.7	▽
糖尿病予備群	16,693	2,142	2,448.8	87.5	84.3	90.8	▽▽
脂質異常症有病者	20,572	10,749	10,799.5	99.5	98.3	100.8	▽
習慣の喫煙者	20,571	2,325	1,797.8	129.3	124.9	133.9	▲▲
習慣の飲酒者	19,820	2,279	2,092.4	108.9	105.1	112.9	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ予備群, 高血圧症有病者, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病予備群,

2)

収縮期血圧高値	19,799	7,509	7,422.5	101.2	99.5	102.9	▲
拡張期血圧高値	19,799	2,812	2,967.9	94.7	91.8	97.8	▽▽
血圧高値	19,799	7,916	7,844.3	100.9	99.3	102.5	▲
空腹時血糖高値	4,762	1,087	1,109.0	98.0	93.1	103.2	▽
HbA1c高値	13,677	6,833	6,992.5	97.7	96.2	99.3	▽▽
血糖高値	16,693	7,642	8,419.3	90.8	89.4	92.2	▽▽
中性脂肪高値	19,639	2,668	2,538.5	105.1	101.7	108.6	▲▲
HDL-C低値	19,639	322	371.3	86.7	78.3	96.0	▽▽
LDL-C高値	19,622	11,016	10,970.6	100.4	99.3	101.6	▲
脂質異常	19,639	11,952	11,920.4	100.3	99.2	101.3	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 中性脂肪高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, HbA1c高値, 血糖高値, HDL-C低値,