

[平成25年度]

6. 福島県 相双地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	1,095	1,005	1,321	1,650	2,400	2,379	1,985	11,835
	割合	3.3%	3.8%	6.8%	10.4%	24.3%	25.6%	25.6%	100.0%
女性	人数	907	999	1,254	1,798	2,866	2,614	2,135	12,573
	割合	3.9%	4.7%	7.6%	12.5%	26.5%	22.6%	22.1%	100.0%
計	人数	2,002	2,004	2,575	3,448	5,266	4,993	4,120	24,408
	割合	8.2%	8.2%	10.5%	14.1%	21.6%	20.5%	16.9%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	11,993	11,993	11,922	11,922	11,720	11,954	11,723	11,670	11,670	11,947	8,929	8,581	366
	平均値	24.44	86.42	130.44	79.52	—	—	122.72	—	—	—	—	—	—
	標準偏差	3.41	9.09	16.04	10.77	—	—	32.20	—	—	—	—	—	—
	中央値	—	—	—	—	112	54	—	24	23	37	100	5.6	0.835
	25パーセン タイル値	—	—	—	—	79	45	—	20	17	24	93	5.3	0.7725
	75パーセン タイル値	—	—	—	—	166	64	—	30	33	63	111	5.9	0.91
女性	度数	12,768	12,763	12,744	12,743	12,560	12,690	12,561	12,371	12,371	12,682	9,837	10,492	386
	平均値	23.52	82.86	125.90	75.00	—	—	128.40	—	—	—	—	—	—
	標準偏差	3.85	10.06	16.18	10.25	—	—	31.61	—	—	—	—	—	—
	中央値	—	—	—	—	91	62	—	21	17	19	94	5.6	0.6
	25パーセン タイル値	—	—	—	—	67	53	—	18	13	15	89	5.3	0.57
	75パーセン タイル値	—	—	—	—	126	73	—	25	23	29	101	5.8	0.7

[平成25年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成25年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成25年度 相双地域(女性)

[illegible]

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成25年度 相双地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25, 腹囲<85/90cm	人数 割合	509 46.5%	408 40.6%	567 42.9%	664 40.2%	947 39.5%	957 40.2%	816 41.1%	4,868 41.1%
BMI≥25, 腹囲<85/90cm	人数 割合	32 2.9%	26 2.6%	31 2.3%	47 2.8%	40 1.7%	46 1.9%	48 2.4%	270 2.3%
BMI<25, 腹囲≥85/90cm	人数 割合	109 10.0%	167 16.6%	210 15.9%	321 19.5%	485 20.2%	481 20.2%	413 20.8%	2,186 18.5%
BMI≥25, 腹囲≥85/90cm	人数 割合	445 40.6%	404 40.2%	513 38.8%	618 37.5%	928 38.7%	895 37.6%	708 35.7%	4,511 38.1%
合計	人数 割合	1,095 100.0%	1,005 100.0%	1,321 100.0%	1,650 100.0%	2,400 100.0%	2,379 100.0%	1,985 100.0%	11,835 100.0%

平成25年度 相双地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	653 72.3%	674 67.5%	877 69.9%	1,184 65.9%	1,920 67.0%	1,662 63.6%	1,279 59.9%	8,249 65.6%
BMI≥25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	110 12.2%	145 14.5%	139 11.1%	220 12.2%	322 11.2%	310 11.9%	256 12.0%	1,502 12.0%
BMI<25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	5 0.6%	19 1.9%	23 1.8%	48 2.7%	97 3.4%	122 4.7%	108 5.1%	422 3.4%
BMI≥25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	135 15.0%	161 16.1%	215 17.1%	345 19.2%	527 18.4%	520 19.9%	492 23.0%	2,395 19.1%
合計	人数 割合	903 100.0%	999 100.0%	1,254 100.0%	1,797 100.0%	2,866 100.0%	2,614 100.0%	2,135 100.0%	12,568 100.0%

[平成25年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合

平成25年度 相双地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	597	476	533	517	647	543	408	3,721
	割合	55.2%	47.8%	40.6%	31.6%	27.0%	22.8%	20.6%	31.6%
予備群	人数	177	144	204	269	356	321	241	1,712
	割合	16.4%	14.5%	15.5%	16.5%	14.9%	13.5%	12.1%	14.5%
有病者	人数	308	375	576	849	1,392	1,515	1,336	6,351
	割合	28.5%	37.7%	43.9%	51.9%	58.1%	63.7%	67.3%	53.9%
合計	人数	1,082	995	1,313	1,635	2,395	2,379	1,985	11,784
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成25年度 相双地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	697	642	705	881	1,276	899	566	5,666
	割合	77.4%	64.5%	56.3%	49.2%	44.6%	34.4%	26.5%	45.1%
予備群	人数	97	128	163	250	412	336	283	1,669
	割合	10.8%	12.9%	13.0%	14.0%	14.4%	12.9%	13.3%	13.3%
有病者	人数	107	225	385	661	1,176	1,377	1,286	5,217
	割合	11.9%	22.6%	30.7%	36.9%	41.1%	52.7%	60.2%	41.6%
合計	人数	901	995	1,253	1,792	2,864	2,612	2,135	12,552
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成25年度 相双地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
収縮期血圧 高値	人数	395	393	601	875	1,338	1,374	1,190	6,166
	割合	36.6%	39.5%	45.8%	53.8%	55.9%	57.9%	59.9%	52.4%
拡張期血圧 高値	人数	323	354	499	617	800	610	388	3,591
	割合	29.9%	35.6%	38.0%	37.9%	33.4%	25.7%	19.5%	30.5%
血圧高値	人数	455	467	690	962	1,437	1,436	1,223	6,670
	割合	42.2%	47.0%	52.6%	59.1%	60.1%	60.5%	61.6%	56.7%

平成25年度 相双地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
収縮期血圧 高値	人数	162	286	430	658	1,183	1,245	1,153	5,117
	割合	18.0%	28.7%	34.3%	36.7%	41.3%	47.7%	54.0%	40.8%
拡張期血圧 高値	人数	101	167	252	331	504	397	277	2,029
	割合	11.2%	16.8%	20.1%	18.5%	17.6%	15.2%	13.0%	16.2%
血圧高値	人数	187	311	465	696	1,248	1,294	1,174	5,375
	割合	20.8%	31.3%	37.1%	38.8%	43.6%	49.5%	55.0%	42.8%

[平成25年度]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合

平成25年度 相双地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	759	660	791	955	1,380	1,357	1,167	7,069
	割合	84.1%	79.6%	71.5%	66.6%	62.4%	58.5%	59.4%	65.7%
予備群	人数	74	86	152	220	361	447	351	1,691
	割合	8.2%	10.4%	13.7%	15.4%	16.3%	19.3%	17.9%	15.7%
有病者	人数	69	83	163	258	471	514	448	2,006
	割合	7.6%	10.0%	14.7%	18.0%	21.3%	22.2%	22.8%	18.6%
合計	人数	902	829	1,106	1,433	2,212	2,318	1,966	10,766
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成25年度 相双地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	690	724	868	1,241	1,988	1,823	1,423	8,757
	割合	93.9%	88.8%	83.9%	78.5%	73.0%	70.6%	67.2%	75.6%
予備群	人数	21	47	105	207	440	434	424	1,678
	割合	2.9%	5.8%	10.2%	13.1%	16.2%	16.8%	20.0%	14.5%
有病者	人数	24	44	61	132	296	326	272	1,155
	割合	3.3%	5.4%	5.9%	8.4%	10.9%	12.6%	12.8%	10.0%
合計	人数	735	815	1,034	1,580	2,724	2,583	2,119	11,590
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(6)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成25年度 相双地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
空腹時血糖高値	人数	252	293	468	612	975	1,022	848	4,470
	割合	36.2%	43.1%	52.1%	54.1%	54.5%	52.4%	51.5%	50.8%
HbA1c高値	人数	140	141	250	389	930	1,254	1,136	4,240
	割合	27.6%	32.1%	39.3%	43.1%	51.1%	57.2%	59.0%	50.3%
血糖高値	人数	342	373	598	807	1,355	1,551	1,324	6,350
	割合	38.1%	45.5%	54.7%	57.6%	62.1%	67.1%	67.4%	59.5%

平成25年度 相双地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
空腹時血糖高値	人数	79	145	211	395	695	738	635	2,898
	割合	13.5%	21.8%	25.3%	30.8%	30.3%	33.2%	35.4%	30.0%
HbA1c高値	人数	93	143	272	665	1,390	1,459	1,274	5,296
	割合	18.5%	25.7%	36.5%	50.8%	54.4%	57.6%	61.0%	51.4%
血糖高値	人数	150	233	385	814	1,562	1,609	1,375	6,128
	割合	20.5%	28.8%	37.4%	51.7%	57.6%	62.3%	64.8%	53.0%

[平成25年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合

平成25年度 相双地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	490	384	510	664	1,002	1,021	913	4,984
	割合	44.7%	38.2%	38.6%	40.2%	41.8%	42.9%	46.0%	42.1%
有病者	人数	605	621	811	986	1,398	1,358	1,072	6,851
	割合	55.3%	61.8%	61.4%	59.8%	58.3%	57.1%	54.0%	57.9%
合計	人数	1,095	1,005	1,321	1,650	2,400	2,379	1,985	11,835
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成25年度 相双地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	655	636	629	675	963	844	705	5,107
	割合	72.2%	63.7%	50.2%	37.5%	33.6%	32.3%	33.0%	40.6%
有病者	人数	252	363	625	1,123	1,903	1,770	1,430	7,466
	割合	27.8%	36.3%	49.8%	62.5%	66.4%	67.7%	67.0%	59.4%
合計	人数	907	999	1,254	1,798	2,866	2,614	2,135	12,573
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(7)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成25年度 相双地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
中性脂肪高値	人数	364	393	490	513	705	615	458	3,538
	割合	34.5%	40.7%	39.0%	32.6%	29.9%	26.0%	23.1%	30.6%
HDL-C低値	人数	124	119	134	157	237	240	205	1,216
	割合	11.4%	11.9%	10.2%	9.6%	9.9%	10.1%	10.3%	10.3%
LDL-C高値	人数	633	601	733	882	1,230	1,135	925	6,139
	割合	60.0%	62.3%	58.3%	55.9%	52.1%	47.9%	46.7%	53.1%
脂質異常	人数	586	595	748	866	1,208	1,106	823	5,932
	割合	53.8%	59.4%	56.9%	52.9%	50.4%	46.6%	41.5%	50.3%

平成25年度 相双地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
中性脂肪高値	人数	83	114	168	342	502	430	339	1,978
	割合	9.4%	12.0%	13.9%	19.6%	17.7%	16.5%	15.9%	16.0%
HDL-C低値	人数	22	36	26	43	83	83	78	371
	割合	2.5%	3.7%	2.1%	2.4%	2.9%	3.2%	3.7%	3.0%
LDL-C高値	人数	390	504	761	1,152	1,774	1,544	1,198	7,323
	割合	44.3%	53.1%	62.9%	65.9%	62.5%	59.2%	56.1%	59.2%
脂質異常	人数	241	336	555	888	1,373	1,162	884	5,439
	割合	26.9%	34.2%	44.9%	49.9%	48.0%	44.5%	41.4%	43.5%

[平成25年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成25年度 相双地域(男性)

[illegible][illegible]

平成25年度 相双地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成25年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成25年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成25年度 相双地域(女性)

[illegible]

[平成25年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成25年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成25年度 相双地域(女性)

[illegible]

[平成25年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成25年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成25年度 相双地域(女性)

[illegible]

[平成25年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合

平成25年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成25年度 相双地域(女性)

[illegible]

[平成25年度]

(11)習慣的喫煙者の割合

平成25年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成25年度 相双地域(女性)

[illegible]

(12)習慣的飲酒者の割合

平成25年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成25年度 相双地域(女性)

[illegible]

[平成25年度]

(13)eGFRの区分

平成25年度 相双地域(男性)



[illegible]

平成25年度 相双地域(女性)



[illegible]

[平成25年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[平成25年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合





(5)-②-A 収縮期血圧高値の割合





[平成25年度]

(5)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(5)-②-C 血圧高値の割合





[平成25年度]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合





(6)-②-A 空腹時血糖高値の割合





[平成25年度]

(6)-②-B HbA1c高値の割合





(6)-②-C 血糖高値の割合





[平成25年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合





(7)-②-A 中性脂肪高値の割合





[平成25年度]

(7)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(7)-②-C LDLコレステロール高値の割合




[平成25年度]

(7)-②-D 脂質異常の割合




[平成25年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合




[平成25年度]

(9)‐① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合




(9)‐② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[平成25年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合





[平成25年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合



[平成25年度]

(11) 習慣的喫煙者の割合



(12) 習慣的飲酒者の割合

