

[平成25年度]

3. 福島県 県南地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 男性 | 人数 | 939 | 837 | 1,071 | 1,451 | 1,850 | 1,801 | 1,514 | 9,463 |
| | 割合 | 9.9% | 8.8% | 11.3% | 15.3% | 19.5% | 19.0% | 16.0% | 100.0% |
| 女性 | 人数 | 648 | 699 | 1,019 | 1,306 | 2,040 | 1,938 | 1,675 | 9,325 |
| | 割合 | 6.9% | 7.5% | 10.9% | 14.0% | 21.9% | 20.8% | 18.0% | 100.0% |
| 計 | 人数 | 1,587 | 1,536 | 2,090 | 2,757 | 3,890 | 3,739 | 3,189 | 18,788 |
| | 割合 | 8.4% | 8.2% | 11.1% | 14.7% | 20.7% | 19.9% | 17.0% | 100.0% |

(2)検査項目別平均値

| | | BMI | 腹囲 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | 中性脂肪 | HDL コレステロール | LDL コレステロール | GOT | GPT | γ-GTP | 空腹時血糖 | HbA1c | 血清 クレアチニン |
|----|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 男性 | 度数 | 9,628 | 9,623 | 9,471 | 9,471 | 9,166 | 9,600 | 9,600 | 9,614 | 9,616 | 9,591 | 7,329 | 6,889 | 5,057 |
| | 平均値 | 23.91 | 84.65 | 127.42 | 77.01 | — | — | 120.77 | — | — | — | — | — | — |
| | 標準偏差 | 3.19 | 8.63 | 15.92 | 10.66 | — | — | 31.79 | — | — | — | — | — | — |
| | 中央値 | — | — | — | — | 106 | 54 | — | 23 | 22 | 34 | 100 | 5.5 | 0.86 |
| | 25パーセン タイル値 | — | — | — | — | 75 | 46 | — | 20 | 16 | 23 | 93 | 5.3 | 0.78 |
| | 75パーセン タイル値 | — | — | — | — | 155 | 64 | — | 29 | 30 | 56 | 109 | 5.8 | 0.95 |
| 女性 | 度数 | 9,512 | 9,511 | 9,474 | 9,474 | 9,234 | 9,500 | 9,499 | 9,507 | 9,507 | 9,479 | 8,077 | 7,685 | 5,997 |
| | 平均値 | 23.19 | 81.78 | 123.89 | 73.15 | — | — | 126.83 | — | — | — | — | — | — |
| | 標準偏差 | 3.62 | 9.67 | 16.18 | 10.02 | — | — | 31.18 | — | — | — | — | — | — |
| | 中央値 | — | — | — | — | 89 | 62 | — | 21 | 17 | 18 | 95 | 5.6 | 0.67 |
| | 25パーセン タイル値 | — | — | — | — | 65 | 53 | — | 18 | 13 | 14 | 89 | 5.4 | 0.61 |
| | 75パーセン タイル値 | — | — | — | — | 122 | 73 | — | 25 | 22 | 26 | 102 | 5.8 | 0.73 |

[平成25年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成25年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成25年度 県南地域(女性)

[illegible]

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成25年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI<25, 腹囲<85/90cm | 人数 割合 | 501 53.4% | 389 46.5% | 555 51.8% | 741 51.1% | 944 51.0% | 845 47.0% | 752 49.7% | 4,727 50.0% |
| BMI≥25, 腹囲<85/90cm | 人数 割合 | 40 4.3% | 27 3.2% | 39 3.6% | 42 2.9% | 47 2.5% | 38 2.1% | 31 2.1% | 264 2.8% |
| BMI<25, 腹囲≥85/90cm | 人数 割合 | 100 10.6% | 113 13.5% | 155 14.5% | 223 15.4% | 321 17.4% | 363 20.2% | 323 21.4% | 1,598 16.9% |
| BMI≥25, 腹囲≥85/90cm | 人数 割合 | 298 31.7% | 308 36.8% | 322 30.1% | 445 30.7% | 538 29.1% | 553 30.7% | 406 26.9% | 2,870 30.3% |
| 合計 | 人数 割合 | 939 100.0% | 837 100.0% | 1,071 100.0% | 1,451 100.0% | 1,850 100.0% | 1,799 100.0% | 1,512 100.0% | 9,459 100.0% |

平成25年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| BMI<25、 腹囲<85/90cm | 人数 割合 | 501 77.3% | 493 70.5% | 737 72.3% | 929 71.1% | 1,412 69.2% | 1,345 69.4% | 1,093 65.3% | 6,510 69.8% |
| BMI≥25、 腹囲<85/90cm | 人数 割合 | 67 10.3% | 97 13.9% | 125 12.3% | 165 12.6% | 220 10.8% | 202 10.4% | 191 11.4% | 1,067 11.4% |
| BMI<25、 腹囲≥85/90cm | 人数 割合 | 6 0.9% | 9 1.3% | 21 2.1% | 40 3.1% | 73 3.6% | 75 3.9% | 78 4.7% | 302 3.2% |
| BMI≥25、 腹囲≥85/90cm | 人数 割合 | 74 11.4% | 100 14.3% | 136 13.3% | 172 13.2% | 335 16.4% | 315 16.3% | 313 18.7% | 1,445 15.5% |
| 合計 | 人数 割合 | 648 100.0% | 699 100.0% | 1,019 100.0% | 1,306 100.0% | 2,040 100.0% | 1,937 100.0% | 1,675 100.0% | 9,324 100.0% |

[平成25年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合

平成25年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 620 | 447 | 518 | 594 | 663 | 551 | 381 | 3,774 |
| | 割合 | 67.6% | 55.2% | 49.9% | 41.9% | 36.1% | 30.7% | 25.2% | 40.5% |
| 予備群 | 人数 | 122 | 127 | 172 | 232 | 279 | 254 | 197 | 1,383 |
| | 割合 | 13.3% | 15.7% | 16.6% | 16.4% | 15.2% | 14.2% | 13.0% | 14.8% |
| 有病者 | 人数 | 175 | 236 | 348 | 591 | 894 | 990 | 934 | 4,168 |
| | 割合 | 19.1% | 29.1% | 33.5% | 41.7% | 48.7% | 55.2% | 61.8% | 44.7% |
| 合計 | 人数 | 917 | 810 | 1,038 | 1,417 | 1,836 | 1,795 | 1,512 | 9,325 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

平成25年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 550 | 516 | 644 | 734 | 958 | 767 | 487 | 4,656 |
| | 割合 | 86.5% | 74.5% | 63.7% | 56.3% | 47.0% | 39.6% | 29.1% | 50.1% |
| 予備群 | 人数 | 40 | 70 | 136 | 167 | 301 | 270 | 206 | 1,190 |
| | 割合 | 6.3% | 10.1% | 13.5% | 12.8% | 14.8% | 13.9% | 12.3% | 12.8% |
| 有病者 | 人数 | 46 | 107 | 231 | 402 | 779 | 899 | 982 | 3,446 |
| | 割合 | 7.2% | 15.4% | 22.8% | 30.9% | 38.2% | 46.4% | 58.6% | 37.1% |
| 合計 | 人数 | 636 | 693 | 1,011 | 1,303 | 2,038 | 1,936 | 1,675 | 9,292 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

(5)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成25年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 収縮期血圧 高値 | 人数 | 232 | 272 | 392 | 631 | 888 | 913 | 812 | 4,140 |
| | 割合 | 25.3% | 33.8% | 37.8% | 44.7% | 48.5% | 50.9% | 53.7% | 44.5% |
| 拡張期血圧 高値 | 人数 | 180 | 222 | 286 | 397 | 419 | 322 | 212 | 2,038 |
| | 割合 | 19.6% | 27.6% | 27.6% | 28.1% | 22.9% | 17.9% | 14.0% | 21.9% |
| 血圧高値 | 人数 | 273 | 323 | 443 | 677 | 934 | 936 | 827 | 4,413 |
| | 割合 | 29.8% | 40.1% | 42.8% | 48.0% | 51.0% | 52.2% | 54.7% | 47.4% |

平成25年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 収縮期血圧 高値 | 人数 | 72 | 139 | 284 | 415 | 794 | 830 | 872 | 3,406 |
| | 割合 | 11.3% | 20.1% | 28.1% | 31.9% | 39.0% | 42.9% | 52.1% | 36.7% |
| 拡張期血圧 高値 | 人数 | 38 | 87 | 139 | 170 | 245 | 205 | 176 | 1,060 |
| | 割合 | 6.0% | 12.6% | 13.8% | 13.1% | 12.0% | 10.6% | 10.5% | 11.4% |
| 血圧高値 | 人数 | 80 | 152 | 308 | 436 | 816 | 853 | 886 | 3,531 |
| | 割合 | 12.6% | 21.9% | 30.5% | 33.5% | 40.1% | 44.1% | 52.9% | 38.0% |

[平成25年度]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合

平成25年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 700 | 582 | 712 | 839 | 1,140 | 1,081 | 906 | 5,960 |
| | 割合 | 88.6% | 82.1% | 76.1% | 67.8% | 65.9% | 61.0% | 60.2% | 68.7% |
| 予備群 | 人数 | 58 | 76 | 107 | 200 | 285 | 325 | 318 | 1,369 |
| | 割合 | 7.3% | 10.7% | 11.4% | 16.2% | 16.5% | 18.4% | 21.1% | 15.8% |
| 有病者 | 人数 | 32 | 51 | 116 | 198 | 304 | 365 | 280 | 1,346 |
| | 割合 | 4.1% | 7.2% | 12.4% | 16.0% | 17.6% | 20.6% | 18.6% | 15.5% |
| 合計 | 人数 | 790 | 709 | 935 | 1,237 | 1,729 | 1,771 | 1,504 | 8,675 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

平成25年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 551 | 550 | 780 | 954 | 1,436 | 1,301 | 1,147 | 6,719 |
| | 割合 | 94.8% | 91.1% | 85.0% | 79.7% | 71.9% | 67.3% | 68.5% | 75.5% |
| 予備群 | 人数 | 16 | 34 | 91 | 156 | 348 | 413 | 308 | 1,366 |
| | 割合 | 2.8% | 5.6% | 9.9% | 13.0% | 17.4% | 21.4% | 18.4% | 15.3% |
| 有病者 | 人数 | 14 | 20 | 47 | 87 | 213 | 219 | 219 | 819 |
| | 割合 | 2.4% | 3.3% | 5.1% | 7.3% | 10.7% | 11.3% | 13.1% | 9.2% |
| 合計 | 人数 | 581 | 604 | 918 | 1,197 | 1,997 | 1,933 | 1,674 | 8,904 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

(6)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成25年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 空腹時血糖高値 | 人数 | 191 | 209 | 321 | 539 | 812 | 877 | 731 | 3,680 |
| | 割合 | 31.5% | 39.4% | 46.3% | 55.6% | 54.8% | 56.1% | 54.7% | 51.2% |
| HbA1c高値 | 人数 | 94 | 114 | 196 | 351 | 698 | 912 | 844 | 3,209 |
| | 割合 | 20.2% | 27.0% | 34.0% | 44.5% | 50.5% | 55.8% | 58.0% | 47.7% |
| 血糖高値 | 人数 | 253 | 283 | 437 | 722 | 1,086 | 1,203 | 1,040 | 5,024 |
| | 割合 | 32.1% | 40.1% | 47.2% | 59.3% | 63.3% | 68.1% | 69.4% | 58.3% |

平成25年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 空腹時血糖高値 | 人数 | 72 | 102 | 219 | 340 | 628 | 645 | 575 | 2,581 |
| | 割合 | 14.6% | 19.2% | 27.3% | 32.6% | 34.8% | 37.1% | 38.3% | 32.6% |
| HbA1c高値 | 人数 | 80 | 110 | 227 | 439 | 1,052 | 1,144 | 1,017 | 4,069 |
| | 割合 | 24.6% | 31.3% | 41.3% | 49.3% | 57.2% | 60.7% | 61.4% | 54.3% |
| 血糖高値 | 人数 | 136 | 184 | 367 | 613 | 1,224 | 1,271 | 1,122 | 4,917 |
| | 割合 | 23.4% | 30.5% | 40.0% | 51.3% | 61.3% | 65.8% | 67.0% | 55.3% |

[平成25年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合

平成25年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 422 | 328 | 440 | 652 | 863 | 862 | 745 | 4,312 |
| | 割合 | 44.9% | 39.2% | 41.1% | 44.9% | 46.6% | 47.9% | 49.2% | 45.6% |
| 有病者 | 人数 | 517 | 509 | 631 | 799 | 987 | 939 | 769 | 5,151 |
| | 割合 | 55.1% | 60.8% | 58.9% | 55.1% | 53.4% | 52.1% | 50.8% | 54.4% |
| 合計 | 人数 | 939 | 837 | 1,071 | 1,451 | 1,850 | 1,801 | 1,514 | 9,463 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

平成25年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 非該当 | 人数 | 491 | 491 | 545 | 564 | 799 | 723 | 634 | 4,247 |
| | 割合 | 75.8% | 70.2% | 53.5% | 43.2% | 39.2% | 37.3% | 37.9% | 45.5% |
| 有病者 | 人数 | 157 | 208 | 474 | 742 | 1,241 | 1,215 | 1,041 | 5,078 |
| | 割合 | 24.2% | 29.8% | 46.5% | 56.8% | 60.8% | 62.7% | 62.1% | 54.5% |
| 合計 | 人数 | 648 | 699 | 1,019 | 1,306 | 2,040 | 1,938 | 1,675 | 9,325 |
| | 割合 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

(7)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成25年度 県南地域(男性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 中性脂肪高値 | 人数 | 289 | 276 | 340 | 412 | 458 | 405 | 280 | 2,460 |
| | 割合 | 33.6% | 35.7% | 34.5% | 30.4% | 25.9% | 23.0% | 18.6% | 27.3% |
| HDL-C低値 | 人数 | 74 | 75 | 105 | 125 | 157 | 162 | 142 | 840 |
| | 割合 | 7.9% | 9.0% | 9.8% | 8.7% | 8.5% | 9.0% | 9.4% | 8.9% |
| LDL-C高値 | 人数 | 534 | 495 | 600 | 728 | 926 | 825 | 613 | 4,721 |
| | 割合 | 57.1% | 59.7% | 56.1% | 50.4% | 50.1% | 45.9% | 40.5% | 50.0% |
| 脂質異常 | 人数 | 500 | 488 | 594 | 713 | 856 | 766 | 574 | 4,491 |
| | 割合 | 53.5% | 58.9% | 55.6% | 49.3% | 46.3% | 42.6% | 37.9% | 47.6% |

平成25年度 県南地域(女性)

| | | 年代別 | | | | | | | 合計 |
|---------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | |
| 中性脂肪高値 | 人数 | 49 | 63 | 137 | 199 | 334 | 312 | 239 | 1,333 |
| | 割合 | 8.2% | 9.8% | 14.2% | 16.1% | 16.7% | 16.2% | 14.3% | 14.7% |
| HDL-C低値 | 人数 | 8 | 20 | 15 | 17 | 49 | 51 | 50 | 210 |
| | 割合 | 1.2% | 2.9% | 1.5% | 1.3% | 2.4% | 2.6% | 3.0% | 2.3% |
| LDL-C高値 | 人数 | 244 | 312 | 600 | 861 | 1,284 | 1,143 | 882 | 5,326 |
| | 割合 | 37.8% | 44.9% | 59.0% | 65.9% | 63.0% | 59.0% | 52.7% | 57.2% |
| 脂質異常 | 人数 | 150 | 197 | 430 | 623 | 950 | 843 | 632 | 3,825 |
| | 割合 | 23.3% | 28.3% | 42.2% | 47.7% | 46.6% | 43.5% | 37.7% | 41.1% |

[平成25年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成25年度 県南地域(男性)

[illegible][illegible]

平成25年度 県南地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成25年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成25年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成25年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成25年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成25年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成25年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成25年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成25年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成25年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成25年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合

平成25年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成25年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成25年度]

(11) 習慣的喫煙者の割合

平成25年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成25年度 県南地域(女性)

[illegible]

(12)習慣的飲酒者の割合

平成25年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成25年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成25年度]

(13)eGFRの区分

平成25年度 県南地域(男性)



[illegible]

平成25年度 県南地域(女性)



[illegible]

[平成25年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[平成25年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合





(5)-②-A 収縮期血圧高値の割合





[平成25年度]

(5)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(5)-②-C 血圧高値の割合





[平成25年度]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合





(6)-②-A 空腹時血糖高値の割合





[平成25年度]

(6)-②-B HbA1c高値の割合





(6)-②-C 血糖高値の割合





[平成25年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合





(7)-②-A 中性脂肪高値の割合





[平成25年度]

(7)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(7)-②-C LDLコレステロール高値の割合




[平成25年度]

(7)-②-D 脂質異常の割合




[平成25年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合




[平成25年度]

(9)‐① 血圧を下げる薬などを服用している(していない)者のうち、高血圧症有病者、予備群




(9)‐② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[平成25年度]

(9)－③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合





[平成25年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合



[平成25年度]

(11) 習慣的喫煙者の割合



(12) 習慣的飲酒者の割合

