

[平成29年度]

3. 福島県 県南地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	1,242	1,059	1,028	1,364	1,776	2,453	1,705	10,627
	割合	11.69%	9.97%	9.67%	12.84%	16.71%	23.08%	16.04%	100.0%
女性	人数	1,059	960	1,036	1,452	1,917	2,602	1,826	10,852
	割合	9.76%	8.85%	9.55%	13.38%	17.66%	23.98%	16.83%	100.0%
計	人数	2,301	2,019	2,064	2,816	3,693	5,055	3,531	21,479
	割合	10.71%	9.40%	9.61%	13.11%	17.19%	23.53%	16.44%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ -GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	10,630	10,629	10,451	10,451	10,623	10,618	10,623	10,624	10,624	10,532	8,824	7,037	4,308
	平均値	24.13	85.47	129.74	78.74	－	－	119.87	－	－	－	－	－	－
	標準偏差	3.38	8.92	16.78	11.53	－	－	31.54	－	－	－	－	－	－
	中央値	－	－	－	－	106	55	－	24	22	34	100	5.6	0.83
	25パーセン タイル値	－	－	－	－	74	47	－	20	16	23	93	5.3	0.75
	75パーセン タイル値	－	－	－	－	157	66	－	29	31	56	110	5.9	0.91
女性	度数	10,854	10,851	10,689	10,687	10,851	10,848	10,851	10,850	10,852	10,748	9,647	7,685	3,345
	平均値	23.11	81.81	125.62	73.80	－	－	123.96	－	－	－	－	－	－
	標準偏差	3.74	9.86	17.35	11.37	－	－	30.93	－	－	－	－	－	－
	中央値	－	－	－	－	85	65	－	21	17	18	95	5.6	0.63
	25パーセン タイル値	－	－	－	－	62	55	－	18	13	14	89	5.4	0.57
	75パーセン タイル値	－	－	－	－	120	75	－	25	22	27	102	5.8	0.69

[平成29年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成29年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県南地域(女性)

[illegible]

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	621 50.0%	528 49.9%	448 43.6%	665 48.8%	822 46.3%	1,109 45.2%	787 46.2%	4,980 46.9%
BMI≥25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	37 3.0%	38 3.6%	25 2.4%	44 3.2%	33 1.9%	39 1.6%	34 2.0%	250 2.4%
BMI<25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	138 11.1%	126 11.9%	155 15.1%	227 16.6%	332 18.7%	508 20.7%	391 23.0%	1,877 17.7%
BMI≥25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	446 35.9%	367 34.7%	400 38.9%	428 31.4%	588 33.1%	797 32.5%	490 28.8%	3,516 33.1%
合計	人数 割合	1,242 100.0%	1,059 100.0%	1,028 100.0%	1,364 100.0%	1,775 100.0%	2,453 100.0%	1,702 100.0%	10,623 100.0%

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	824 86.2%	695 81.4%	714 68.9%	1,046 72.1%	1,318 68.8%	1,818 69.9%	1,210 66.5%	7,625 71.7%
BMI≥25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	14 1.5%	19 2.2%	123 11.9%	123 8.5%	207 10.8%	276 10.6%	200 11.0%	962 9.0%
BMI<25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	2 0.2%	2 0.2%	17 1.6%	38 2.6%	75 3.9%	77 3.0%	74 4.1%	285 2.7%
BMI≥25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	116 12.1%	138 16.2%	182 17.6%	244 16.8%	316 16.5%	430 16.5%	335 18.4%	1,761 16.6%
合計	人数 割合	956 100.0%	854 100.0%	1,036 100.0%	1,451 100.0%	1,916 100.0%	2,601 100.0%	1,819 100.0%	10,633 100.0%

[平成29年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	720	508	419	486	484	623	381	3,621
	割合	59%	49%	42%	36%	28%	26%	22%	34%
予備群	人数	232	187	166	209	263	348	216	1,621
	割合	18.9%	17.9%	16.6%	15.6%	15.0%	14.3%	12.7%	15.4%
有病者	人数	274	348	418	645	1,010	1,462	1,103	5,260
	割合	22.3%	33.4%	41.7%	48.1%	57.5%	60.1%	64.9%	50.1%
合計	人数	1,226	1,043	1,003	1,340	1,757	2,433	1,700	10,502
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	817	687	614	724	813	886	460	5,001
	割合	78.0%	72.7%	60.1%	50.6%	42.9%	34.5%	25.3%	46.6%
予備群	人数	126	118	154	243	273	358	223	1,495
	割合	12.0%	12.5%	15.1%	17.0%	14.4%	13.9%	12.3%	13.9%
有病者	人数	105	140	254	463	808	1,326	1,133	4,229
	割合	10.0%	14.8%	24.9%	32.4%	42.7%	51.6%	62.4%	39.4%
合計	人数	1,048	945	1,022	1,430	1,894	2,570	1,816	10,725
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
収縮期血圧 高値	人数	408	408	442	654	962	1,345	978	5,197
	割合	33.4%	39.2%	44.2%	49.2%	55.3%	55.6%	57.7%	11.9%
拡張期血圧 高値	人数	292	359	363	480	574	634	365	3,067
	割合	23.9%	34.5%	36.3%	36.1%	33.0%	26.2%	21.5%	7.0%
血圧高値	人数	476	488	504	723	1,033	1,427	1,026	5,677
	割合	38.9%	46.9%	50.5%	54.4%	59.4%	59.0%	60.5%	13.0%

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
収縮期血圧 高値	人数	177	200	323	523	819	1,256	1,014	4,312
	割合	16.9%	21.2%	31.6%	36.7%	43.5%	49.2%	56.0%	10.0%
拡張期血圧 高値	人数	120	131	190	272	348	452	279	1,792
	割合	11.5%	13.9%	18.6%	19.1%	18.5%	17.7%	15.4%	4.2%
血圧高値	人数	217	232	360	583	866	1,320	1,047	4,625
	割合	20.7%	24.6%	35.3%	40.9%	46.0%	51.7%	57.8%	10.7%

[平成29年度]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1,103	895	790	988	1,164	1,543	986	7,469
	割合	88.4%	84.2%	76.5%	71.5%	64.9%	62.5%	57.5%	69.8%
予備群	人数	78	98	125	205	305	456	341	1,608
	割合	6.3%	9.2%	12.1%	14.8%	17.0%	18.5%	19.9%	15.0%
有病者	人数	67	70	118	189	325	469	388	1,626
	割合	5.4%	6.6%	11.4%	13.7%	18.1%	19.0%	22.6%	15.2%
合計	人数	1,248	1,063	1,033	1,382	1,794	2,468	1,715	10,703
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1,016	895	918	1,187	1,469	1,858	1,215	8,558
	割合	95.4%	92.3%	87.3%	80.1%	75.0%	70.8%	65.8%	77.8%
予備群	人数	32	43	80	187	305	473	393	1,513
	割合	3.0%	4.4%	7.6%	12.6%	15.6%	18.0%	21.3%	13.8%
有病者	人数	17	32	54	108	185	293	239	928
	割合	1.6%	3.3%	5.1%	7.3%	9.4%	11.2%	12.9%	8.4%
合計	人数	1,065	970	1,052	1,482	1,959	2,624	1,847	10,999
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(6)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
空腹時血糖高値	人数	319	329	380	563	847	1,214	875	4,527
	割合	32.7%	39.5%	45.2%	50.9%	56.5%	57.8%	59.7%	12.8%
HbA1c高値	人数	127	127	197	338	568	1,211	988	3,556
	割合	23.8%	26.3%	40.1%	47.7%	51.5%	57.4%	61.4%	13.3%
血糖高値	人数	410	414	501	744	1,100	1,686	1,226	6,081
	割合	33.1%	39.1%	48.7%	54.6%	62.0%	68.8%	71.9%	13.1%

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
空腹時血糖高値	人数	137	166	255	421	656	914	673	3,222
	割合	14.1%	19.0%	26.8%	32.2%	38.9%	39.8%	43.1%	9.4%
HbA1c高値	人数	78	114	175	377	872	1,460	1,152	4,228
	割合	20.6%	29.2%	39.9%	50.9%	58.4%	59.9%	63.9%	13.1%
血糖高値	人数	198	248	375	655	1,142	1,687	1,268	5,573
	割合	18.7%	25.9%	36.2%	45.1%	59.6%	64.9%	69.4%	11.9%

[平成29年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	578	468	404	595	780	1,184	806	4,815
	割合	46.5%	44.2%	39.3%	43.6%	43.9%	48.3%	47.3%	45.3%
有病者	人数	664	591	624	769	996	1,269	899	5,812
	割合	53.5%	55.8%	60.7%	56.4%	56.1%	51.7%	52.7%	54.7%
合計	人数	1,242	1,059	1,028	1,364	1,776	2,453	1,705	10,627
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	837	703	613	672	784	980	694	5,283
	割合	79.0%	73.2%	59.2%	46.3%	40.9%	37.7%	38.0%	48.7%
有病者	人数	222	257	423	780	1,133	1,622	1,132	5,569
	割合	21.0%	26.8%	40.8%	53.7%	59.1%	62.3%	62.0%	51.3%
合計	人数	1,059	960	1,036	1,452	1,917	2,602	1,826	10,852
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(7)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成29年度 県南地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
中性脂肪高値	人数	406	355	354	412	519	561	344	2,951
	割合	32.8%	33.6%	34.5%	30.2%	29.2%	22.9%	20.2%	6.4%
HDL-C低値	人数	117	86	83	117	126	183	106	818
	割合	9.5%	8.1%	8.1%	8.6%	7.1%	7.5%	6.2%	1.8%
LDL-C高値	人数	652	585	577	692	880	1,107	670	5,163
	割合	52.7%	55.3%	56.2%	50.7%	49.5%	45.1%	39.3%	11.1%
脂質異常	人数	643	556	572	682	841	1,019	625	4,938
	割合	51.9%	52.6%	55.7%	50.0%	47.4%	41.5%	36.7%	10.7%

平成29年度 県南地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
中性脂肪高値	人数	77	90	132	218	286	403	285	1,491
	割合	7.3%	9.4%	12.7%	15.0%	14.9%	15.5%	15.6%	3.2%
HDL-C低値	人数	23	14	18	6	21	57	40	179
	割合	2.2%	1.5%	1.7%	0.4%	1.1%	2.2%	2.2%	0.4%
LDL-C高値	人数	344	411	586	890	1,204	1,486	909	5,830
	割合	32.5%	42.9%	56.6%	61.3%	62.8%	57.1%	49.8%	12.5%
脂質異常	人数	210	240	377	624	835	1,067	653	4,006
	割合	19.9%	25.0%	36.4%	43.0%	43.6%	41.0%	35.8%	8.6%

[平成29年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成29年度 県南地域(男性)

[illegible][illegible]

平成29年度 県南地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成29年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成29年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成29年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成29年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合

平成29年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県南地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(11)習慣的喫煙者の割合

平成29年度 県南地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県南地域(女性)

[illegible]

(12) 習慣的飲酒者の割合

平成29年度 県南地域(男性)


[illegible]

平成29年度 県南地域(女性)


[illegible]

[平成29年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





[平成29年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合





(5)-②-A 収縮期血圧高値の割合





[平成29年度]

(5)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(5)-②-C 血圧高値の割合





[平成29年度]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合





(6)-②-A 空腹時血糖高値の割合





[平成29年度]

(6)-②-B HbA1c高値の割合





(6)-②-C 血糖高値の割合





[平成29年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合





(7)-②-A 中性脂肪高値の割合





[平成29年度]

(7)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(7)-②-C LDLコレステロール高値の割合




[平成29年度]

(7)-②-D 脂質異常の割合




[平成29年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合




[平成29年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合




(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[平成29年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合





[平成29年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合



[平成29年度]

(11) 習慣的喫煙者の割合



(12) 習慣的飲酒者の割合

