

[平成29年度]

2. 福島県 県中地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	90	92	3,331	2,309	947	195	20	1	6,985
	割合	1.29%	1.32%	47.69%	33.06%	13.56%	2.79%	0.29%	0.01%	100.0%
女性	人数	82	93	4,326	3,254	1,331	302	29	4	9,421
	割合	0.87%	0.99%	45.92%	34.54%	14.13%	3.21%	0.31%	0.04%	100.0%
計	人数	172	185	7,657	5,563	2,278	497	49	5	16,406
	割合	1.05%	1.13%	46.67%	33.91%	13.89%	3.03%	0.30%	0.03%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ -GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	6,985	402	6,982	6,985	6,981	6,980	6,978	6,980	6,980	6,981	5,872	6,980	1,756
	平均値	23.52	85.91	132.16	72.47	-	-	108.74	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	2.97	8.93	16.21	10.58	-	-	27.61	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	92	54	-	24	17	25	99	5.7	0.89
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	68	46	-	20	14	18	92	5.4	0.78
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	129	65	-	29	23	38	110	6.1	1.02
女性	度数	9,421	607	9,421	9,421	9,420	9,420	9,419	9,419	9,420	9,420	7,811	9,418	2,573
	平均値	23.24	84.17	132.47	72.13	-	-	116.37	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3.50	10.20	15.50	10.29	-	-	27.53	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	93	61	-	23	16	17	96	5.7	0.69
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	71	52	-	20	13	14	89	5.5	0.61
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	125	72	-	27	20	24	105	6.0	0.80

[平成29年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成29年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県中地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
メタボ非該当	人数 割合	76 92.7%	92 98.9%	4,248 98.2%	3,195 98.2%	1,310 98.4%	296 98.0%	28 96.6%	4 100.0%	9,249 98.2%
メタボ予備群	人数 割合	3 3.7%	0 0.0%	21 0.5%	9 0.3%	5 0.4%	1 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	39 0.4%
メタボ該当	人数 割合	3 3.7%	1 1.1%	57 1.3%	50 1.5%	16 1.2%	5 1.7%	1 3.4%	0 0.0%	133 1.4%
合計	人数 割合	82 100.0%	93 100.0%	4,326 100.0%	3,254 100.0%	1,331 100.0%	302 100.0%	29 100.0%	4 100.0%	9,421 100.0%

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成29年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県中地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
BMI<25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	6 46.2%	4 80.0%	148 58.3%	112 54.9%	77 70.6%	14 66.7%	0 0.0%	0 0.0%	361 59.5%
BMI≥25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	1 7.7%	0 0.0%	28 11.0%	33 16.2%	9 8.3%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	72 11.9%
BMI<25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	0 0.0%	0 0.0%	18 7.1%	23 11.3%	6 5.5%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	48 7.9%
BMI≥25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	6 46.2%	1 20.0%	60 23.6%	36 17.6%	17 15.6%	5 23.8%	1 100.0%	0 0.0%	126 20.8%
合計	人数 割合	13 100.0%	5 100.0%	254 100.0%	204 100.0%	109 100.0%	21 100.0%	1 100.0%	0 0.0%	607 100.0%

[平成29年度]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成29年度 県中地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	18	12	639	391	164	32	1	0	1,257
	割合	20.0%	13.0%	19.2%	16.9%	17.3%	16.4%	5.0%	0.0%	18%
予備群	人数	5	10	326	183	73	16	3	0	616
	割合	5.6%	10.9%	9.8%	7.9%	7.7%	8.2%	15.0%	0.0%	8.8%
有病者	人数	67	70	2,365	1,735	709	147	16	1	5,110
	割合	74.4%	76.1%	71.0%	75.1%	74.9%	75.4%	80.0%	100.0%	73.2%
合計	人数	90	92	3,330	2,309	946	195	20	1	6,983
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 県中地域(女性)

		年代別							合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		100歳～
非該当	人数	20	25	890	479	157	27	3	0	1,601
	割合	24.4%	26.9%	20.6%	14.7%	11.8%	8.9%	10.3%	0.0%	17.0%
予備群	人数	12	8	453	219	93	18	2	0	805
	割合	14.6%	8.6%	10.5%	6.7%	7.0%	6.0%	6.9%	0.0%	8.5%
有病者	人数	50	60	2,983	2,556	1,081	257	24	4	7,015
	割合	61.0%	64.5%	69.0%	78.5%	81.2%	85.1%	82.8%	100.0%	74.5%
合計	人数	82	93	4,326	3,254	1,331	302	29	4	9,421
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成29年度 県中地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧	人数	42	48	1,853	1,294	519	116	15	0	3,887
	高値割合	46.7%	52.2%	55.6%	56.1%	54.9%	59.5%	75.0%	0.0%	44.8%
拡張期血圧	人数	22	14	427	270	81	12	1	0	827
	高値割合	24.4%	15.2%	12.8%	11.7%	8.6%	6.2%	5.0%	0.0%	9.5%
血圧高値	人数	46	50	1,896	1,319	525	117	15	0	3,968
	割合	51.1%	54.3%	56.9%	57.1%	55.4%	60.0%	75.0%	0.0%	45.8%

平成29年度 県中地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	47	44	2,388	1,900	794	186	15	2	5,376
	割合	57.3%	47.3%	55.2%	58.4%	59.7%	61.6%	51.7%	50.0%	49.7%
拡張期血圧 高値	人数	9	13	469	365	124	19	3	0	1,002
	割合	11.0%	14.0%	10.8%	11.2%	9.3%	6.3%	10.3%	0.0%	9.3%
血圧高値	人数	47	46	2,433	1,929	803	188	15	2	5,463
	割合	57.3%	49.5%	56.2%	59.3%	60.3%	62.3%	51.7%	50.0%	50.5%

[平成29年度]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成29年度 県中地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	51	48	1,842	1,297	547	122	10	0	3,917
	割合	56.7%	52.2%	55.3%	56.2%	57.9%	62.9%	50.0%	0.0%	56.1%
予備群	人数	17	19	781	553	228	41	3	1	1,643
	割合	18.9%	20.7%	23.4%	24.0%	24.1%	21.1%	15.0%	100.0%	23.5%
有病者	人数	22	25	708	458	170	31	7	0	1,421
	割合	24.4%	27.2%	21.3%	19.8%	18.0%	16.0%	35.0%	0.0%	20.4%
合計	人数	90	92	3,331	2,308	945	194	20	1	6,981
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 県中地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	48	57	2,677	1,977	828	200	15	3	5,805
	割合	58.5%	61.3%	61.9%	60.8%	62.2%	66.2%	51.7%	75.0%	61.6%
予備群	人数	21	24	1,100	804	308	70	7	1	2,335
	割合	25.6%	25.8%	25.4%	24.7%	23.1%	23.2%	24.1%	25.0%	24.8%
有病者	人数	13	12	549	472	195	32	7	0	1,280
	割合	15.9%	12.9%	12.7%	14.5%	14.7%	10.6%	24.1%	0.0%	13.6%
合計	人数	82	93	4,326	3,253	1,331	302	29	4	9,420
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成29年度 県中地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	36	41	1,388	964	346	70	5	1	2,851
	割合	42.9%	53.2%	48.4%	49.6%	46.6%	47.9%	41.7%	100.0%	37.1%
HbA1c高値	人数	63	61	2,207	1,483	599	121	13	0	4,547
	割合	70.0%	66.3%	66.3%	64.3%	63.4%	62.4%	65.0%	0.0%	52.6%
血糖高値	人数	66	67	2,442	1,675	674	138	13	1	5,076
	割合	73.3%	72.8%	73.3%	72.6%	71.3%	71.1%	65.0%	100.0%	58.6%

平成29年度 県中地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	24	24	1,374	1,017	396	91	9	0	2,935
	割合	33.8%	28.2%	37.1%	37.9%	38.3%	42.3%	42.9%	0.0%	29.9%
HbA1c高値	人数	52	52	2,875	2,201	862	186	19	3	6,250
	割合	63.4%	55.9%	66.5%	67.7%	64.8%	61.6%	65.5%	75.0%	58.0%
血糖高値	人数	54	56	3,082	2,354	942	202	21	3	6,714
	割合	65.9%	60.2%	71.2%	72.4%	70.8%	66.9%	72.4%	75.0%	62.2%

[平成29年度]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成29年度 県中地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	48	43	1,638	1,232	551	124	16	0	3,652
	割合	53.3%	46.7%	49.2%	53.4%	58.2%	63.6%	80.0%	0.0%	52.3%
有病者	人数	42	49	1,693	1,077	396	71	4	1	3,333
	割合	46.7%	53.3%	50.8%	46.6%	41.8%	36.4%	20.0%	100.0%	47.7%
合計	人数	90	92	3,331	2,309	947	195	20	1	6,985
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 県中地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	29	34	1,617	1,243	587	157	17	3	3,687
	割合	35.4%	36.6%	37.4%	38.2%	44.1%	52.0%	58.6%	75.0%	39.1%
有病者	人数	53	59	2,709	2,011	744	145	12	1	5,734
	割合	64.6%	63.4%	62.6%	61.8%	55.9%	48.0%	41.4%	25.0%	60.9%
合計	人数	82	93	4,326	3,254	1,331	302	29	4	9,421
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成29年度 県中地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	16	18	631	371	123	19	1	0	1,179
	割合	17.8%	19.6%	18.9%	16.1%	13.0%	9.8%	5.0%	0.0%	13.6%
HDL-C低値	人数	3	14	311	268	119	23	3	1	742
	割合	3.3%	15.2%	9.3%	11.6%	12.6%	11.9%	15.0%	100.0%	8.6%
LDL-C高値	人数	29	32	1,234	766	265	46	2	1	2,375
	割合	32.2%	34.8%	37.1%	33.2%	28.0%	23.7%	10.0%	100.0%	27.4%
脂質異常	人数	26	33	1,124	710	263	48	4	1	2,209
	割合	28.9%	35.9%	33.7%	30.8%	27.8%	24.7%	20.0%	100.0%	25.5%

平成29年度 県中地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	11	18	644	514	183	35	3	0	1,408
	割合	13.4%	19.4%	14.9%	15.8%	13.7%	11.6%	10.3%	0.0%	13.0%
HDL-C低値	人数	1	0	160	117	69	25	2	1	375
	割合	1.2%	0.0%	3.7%	3.6%	5.2%	8.3%	6.9%	25.0%	3.5%
LDL-C高値	人数	42	41	1,908	1,393	537	118	12	1	4,052
	割合	51.2%	44.1%	44.1%	42.8%	40.3%	39.1%	41.4%	25.0%	37.5%
脂質異常	人数	23	29	1,391	1,054	387	86	9	1	2,980
	割合	28.0%	31.2%	32.2%	32.4%	29.1%	28.5%	31.0%	25.0%	27.6%

[平成29年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成29年度 県中地域(男性)

[illegible]

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数 割合	35 61.4%	31 50.0%	1,185 52.2%	815 52.1%	377 53.5%	80 51.3%	9 56.3%	0 0.0%	2,532 52.4%
リスク2個以上	人数 割合	22 38.6%	31 50.0%	1,087 47.8%	750 47.9%	328 46.5%	76 48.7%	7 43.8%	1 100.0%	2,302 47.6%
合計	人数 割合	57 100.0%	62 100.0%	2,272 100.0%	1,565 100.0%	705 100.0%	156 100.0%	16 100.0%	1 100.0%	4,834 100.0%

平成29年度 県中地域(女性)

[illegible]

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数 割合	31 54.4%	38 64.4%	1,769 57.7%	1,229 54.0%	514 54.2%	121 55.8%	13 56.5%	2 50.0%	3,717 55.9%
リスク2個以上	人数 割合	26 45.6%	21 35.6%	1,298 42.3%	1,045 46.0%	435 45.8%	96 44.2%	10 43.5%	2 50.0%	2,933 44.1%
合計	人数 割合	57 100.0%	59 100.0%	3,067 100.0%	2,274 100.0%	949 100.0%	217 100.0%	23 100.0%	4 100.0%	6,650 100.0%

[平成29年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成29年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県中地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成29年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県中地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成29年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県中地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成29年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県中地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数 割合	3 60.0%	4 100.0%	247 56.4%	214 54.6%	111 50.9%	34 61.8%	5 62.5%	0 0.0%	618 55.1%
尿蛋白(+)以上	人数 割合	2 40.0%	0 0.0%	191 43.6%	178 45.4%	107 49.1%	21 38.2%	3 37.5%	2 100.0%	504 44.9%
合計	人数 割合	5 100.0%	4 100.0%	438 100.0%	392 100.0%	218 100.0%	55 100.0%	8 100.0%	2 100.0%	1,122 100.0%

[平成29年度]

(8)習慣的喫煙者の割合

平成29年度 県中地域(男性)

[illegible]

平成29年度 県中地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成29年度 県中地域(男性)



[illegible]

平成29年度 県中地域(女性)



[illegible]

[平成29年度]



(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合





(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合





(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合





(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合





(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合



(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





(5)-②-D 脂質異常の割合




[平成29年度]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合



(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合





(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[平成29年度]



(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合



(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

