

[ 平成29年度 ]

## 6. 福島県 相双地域の状況

### (1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
男性	人数	11	32	1,272	948	378	74	8	0	2,723
	割合	0.40%	1.18%	46.71%	34.81%	13.88%	2.72%	0.29%	0.00%	100.0%
女性	人数	13	24	1,524	1,094	362	46	3	0	3,066
	割合	0.42%	0.78%	49.71%	35.68%	11.81%	1.50%	0.10%	0.00%	100.0%
計	人数	24	56	2,796	2,042	740	120	11	0	5,789
	割合	0.41%	0.97%	48.30%	35.27%	12.78%	2.07%	0.19%	0.00%	100.0%

### (2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ-GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	2,723	52	2,723	2,723	2,720	2,720	2,719	2,720	2,719	2,720	2,178	2,719	20
	平均値	24.05	85.99	133.55	71.77	-	-	110.57	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3.10	6.09	16.76	10.93	-	-	29.00	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	97	55	-	25	17	25	102	5.7	0.85
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	71	46	-	21	13	19	95	5.5	0.80
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	136	65	-	30	24	39	114	6.1	0.98
女性	度数	3,066	67	3,066	3,065	3,065	3,065	3,065	3,065	3,065	3,065	2,443	3,065	23
	平均値	23.67	84.19	132.84	71.40	-	-	118.02	-	-	-	-	-	-
	標準偏差	3.61	11.25	15.78	10.99	-	-	27.81	-	-	-	-	-	-
	中央値	-	-	-	-	98	63	-	23	15	18	98	5.7	0.70
	25パーセン タイル値	-	-	-	-	74	54	-	20	12	14	92	5.5	0.61
	75パーセン タイル値	-	-	-	-	129	72	-	28	20	25	107	6.0	0.77

[ 平成29年度 ]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成29年度 相双地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
メタボ非該当	人数	11	32	1,253	937	370	73	7	2,683
	割合	100.0%	100.0%	98.8%	99.4%	98.4%	100.0%	87.5%	99.0%
メタボ予備群	人数	0	0	6	1	2	0	1	10
	割合	0.0%	0.0%	0.5%	0.1%	0.5%	0.0%	12.5%	0.4%
メタボ該当	人数	0	0	9	5	4	0	0	18
	割合	0.0%	0.0%	0.7%	0.5%	1.1%	0.0%	0.0%	0.7%
合計	人数	11	32	1,268	943	376	73	8	2,711
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 相双地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
メタボ非該当	人数	13	24	1,504	1,077	345	45	3	3,011
	割合	100.0%	100.0%	99.4%	99.6%	98.6%	100.0%	100.0%	99.4%
メタボ予備群	人数	0	0	4	1	2	0	0	7
	割合	0.0%	0.0%	0.3%	0.1%	0.6%	0.0%	0.0%	0.2%
メタボ該当	人数	0	0	5	3	3	0	0	11
	割合	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.9%	0.0%	0.0%	0.4%
合計	人数	13	24	1,513	1,081	350	45	3	3,029
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成29年度 相双地域(男性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
BMI<25,	人数	0	1	13	3	1	1	0	19
腹囲<85/90cm	割合	0.0%	100.0%	41.9%	27.3%	14.3%	100.0%	0.0%	36.5%
BMI≥25,	人数	0	0	1	1	0	0	0	2
腹囲<85/90cm	割合	0.0%	0.0%	3.2%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%
BMI<25,	人数	0	0	10	5	3	0	0	18
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	0.0%	32.3%	45.5%	42.9%	0.0%	0.0%	34.6%
BMI≥25,	人数	0	0	7	2	3	0	1	13
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	0.0%	22.6%	18.2%	42.9%	0.0%	100.0%	25.0%
合計	人数	0	1	31	11	7	1	1	52
	割合	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成29年度 相双地域(女性)

		年代別							合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	
BMI<25,	人数	1	0	21	13	2	1	1	39
腹囲<85/90cm	割合	100.0%	0.0%	60.0%	68.4%	22.2%	50.0%	100.0%	58.2%
BMI≥25,	人数	0	0	5	2	2	1	0	10
腹囲<85/90cm	割合	0.0%	0.0%	14.3%	10.5%	22.2%	50.0%	0.0%	14.9%
BMI<25,	人数	0	0	3	0	0	0	0	3
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	0.0%	8.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%
BMI≥25,	人数	0	0	6	4	5	0	0	15
腹囲≥85/90cm	割合	0.0%	0.0%	17.1%	21.1%	55.6%	0.0%	0.0%	22.4%
合計	人数	1	0	35	19	9	2	1	67
	割合	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

[ 平成29年度 ]

(3)-① 高血圧症有病者等の割合

平成29年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	4	5	219	150	65	12	1	0	456
	割合	36.4%	15.6%	17.2%	15.8%	17.2%	16.2%	12.5%	0.0%	17%
予備群	人数	1	4	151	110	35	6	3	0	310
	割合	9.1%	12.5%	11.9%	11.6%	9.3%	8.1%	37.5%	0.0%	11.4%
有病者	人数	6	23	902	688	278	56	4	0	1,957
	割合	54.5%	71.9%	70.9%	72.6%	73.5%	75.7%	50.0%	0.0%	71.9%
合計	人数	11	32	1,272	948	378	74	8	0	2,723
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成29年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	5	6	323	157	45	3	0	0	539
	割合	38.5%	25.0%	21.2%	14.4%	12.4%	6.5%	0.0%	0.0%	17.6%
予備群	人数	3	1	181	117	27	3	0	0	332
	割合	23.1%	4.2%	11.9%	10.7%	7.5%	6.5%	0.0%	0.0%	10.8%
有病者	人数	5	17	1,020	820	290	40	3	0	2,195
	割合	38.5%	70.8%	66.9%	75.0%	80.1%	87.0%	100.0%	0.0%	71.6%
合計	人数	13	24	1,524	1,094	362	46	3	0	3,066
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

(3)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成29年度 相双地域(男性)

		年代別							合計	
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳		100歳～
収縮期血圧 高値	人数	5	15	781	570	233	50	4	0	1,658
	割合	45.5%	46.9%	61.4%	60.1%	61.6%	67.6%	50.0%	0.0%	19.1%
拡張期血圧 高値	人数	0	6	176	116	42	7	0	0	347
	割合	0.0%	18.8%	13.8%	12.2%	11.1%	9.5%	0.0%	0.0%	4.0%
血圧高値	人数	5	17	797	580	239	50	4	0	1,692
	割合	45.5%	53.1%	62.7%	61.2%	63.2%	67.6%	50.0%	0.0%	19.5%

平成29年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
収縮期血圧 高値	人数	5	11	881	686	228	34	3	0	1,848
	割合	38.5%	45.8%	57.8%	62.7%	63.0%	73.9%	100.0%	0.0%	17.1%
拡張期血圧 高値	人数	0	0	181	124	47	3	0	0	355
	割合	0.0%	0.0%	11.9%	11.3%	13.0%	6.5%	0.0%	0.0%	3.3%
血圧高値	人数	5	11	895	706	233	34	3	0	1,887
	割合	38.5%	45.8%	58.7%	64.5%	64.4%	73.9%	100.0%	0.0%	17.5%

[ 平成29年度 ]

(4)-① 糖尿病有病者等の割合

平成29年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	9	21	689	524	218	43	6	0	1,510
	割合	81.8%	65.6%	54.2%	55.4%	57.7%	58.1%	75.0%	0.0%	55.5%
予備群	人数	0	6	289	196	89	17	1	0	598
	割合	0.0%	18.8%	22.7%	20.7%	23.5%	23.0%	12.5%	0.0%	22.0%
有病者	人数	2	5	293	226	71	14	1	0	612
	割合	18.2%	15.6%	23.1%	23.9%	18.8%	18.9%	12.5%	0.0%	22.5%
合計	人数	11	32	1,271	946	378	74	8	0	2,720
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成29年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	4	16	920	671	223	28	2	0	1,864
	割合	30.8%	69.6%	60.4%	61.3%	61.6%	60.9%	66.7%	0.0%	60.8%
予備群	人数	3	6	390	249	98	11	1	0	758
	割合	23.1%	26.1%	25.6%	22.8%	27.1%	23.9%	33.3%	0.0%	24.7%
有病者	人数	6	1	214	174	41	7	0	0	443
	割合	46.2%	4.3%	14.0%	15.9%	11.3%	15.2%	0.0%	0.0%	14.5%
合計	人数	13	23	1,524	1,094	362	46	3	0	3,065
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

(4)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成29年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	5	14	628	415	177	38	2	0	1,279
	割合	71.4%	53.8%	59.2%	57.1%	61.2%	61.3%	33.3%	0.0%	16.6%
HbA1c高値	人数	5	17	807	624	256	45	3	0	1,757
	割合	45.5%	53.1%	63.5%	66.0%	67.7%	60.8%	37.5%	0.0%	20.3%
血糖高値	人数	6	20	935	701	294	57	3	0	2,016
	割合	54.5%	62.5%	73.6%	74.1%	77.8%	77.0%	37.5%	0.0%	23.3%

平成29年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
空腹時血糖高値	人数	8	5	550	386	139	15	2	0	1,105
	割合	72.7%	27.8%	44.2%	45.0%	50.0%	46.9%	66.7%	0.0%	11.3%
HbA1c高値	人数	10	12	1,038	755	242	33	2	0	2,092
	割合	76.9%	52.2%	68.1%	69.0%	66.9%	71.7%	66.7%	0.0%	19.4%
血糖高値	人数	10	13	1,120	822	274	37	3	0	2,279
	割合	76.9%	56.5%	73.5%	75.1%	75.7%	80.4%	100.0%	0.0%	21.1%

[ 平成29年度 ]

(5)-① 脂質異常症有病者の割合

平成29年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	4	13	591	450	202	49	6	0	1,315
	割合	36.4%	40.6%	46.5%	47.5%	53.4%	66.2%	75.0%	#DIV/0!	48.3%
有病者	人数	7	19	681	498	176	25	2	0	1,408
	割合	63.6%	59.4%	53.5%	52.5%	46.6%	33.8%	25.0%	#DIV/0!	51.7%
合計	人数	11	32	1,272	948	378	74	8	0	2,723
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

平成29年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数	6	5	516	411	155	22	1	0	1,116
	割合	46.2%	20.8%	33.9%	37.6%	42.8%	47.8%	33.3%	#DIV/0!	36.4%
有病者	人数	7	19	1,008	683	207	24	2	0	1,950
	割合	53.8%	79.2%	66.1%	62.4%	57.2%	52.2%	66.7%	#DIV/0!	63.6%
合計	人数	13	24	1,524	1,094	362	46	3	0	3,066
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	#DIV/0!	100.0%

(5)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成29年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	7	9	258	195	51	9	0	0	529
	割合	63.6%	28.1%	20.3%	20.6%	13.5%	12.2%	0.0%	0.0%	6.1%
HDL-C低値	人数	1	3	110	110	42	5	1	0	272
	割合	9.1%	9.4%	8.7%	11.6%	11.1%	6.8%	12.5%	0.0%	3.1%
LDL-C高値	人数	3	11	507	343	113	24	3	0	1,004
	割合	27.3%	34.4%	39.9%	36.3%	29.9%	32.4%	37.5%	0.0%	11.6%
脂質異常	人数	7	13	471	354	112	18	2	0	977
	割合	63.6%	40.6%	37.1%	37.4%	29.6%	24.3%	25.0%	0.0%	11.3%

平成29年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
中性脂肪高値	人数	1	4	264	165	50	9	2	0	495
	割合	7.7%	17.4%	17.3%	15.1%	13.8%	19.6%	66.7%	0.0%	4.6%
HDL-C低値	人数	1	1	26	44	7	3	1	0	83
	割合	7.7%	4.3%	1.7%	4.0%	1.9%	6.5%	33.3%	0.0%	0.8%
LDL-C高値	人数	7	8	720	495	154	18	1	0	1,403
	割合	53.8%	34.8%	47.2%	45.2%	42.5%	39.1%	33.3%	0.0%	13.0%
脂質異常	人数	4	8	536	371	117	16	2	0	1,054
	割合	30.8%	34.8%	35.2%	33.9%	32.3%	34.8%	66.7%	0.0%	9.8%

[平成29年度]

(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成29年度 相双地域(男性)

[illegible]

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数 割合	3 60.0%	11 61.1%	373 48.8%	288 48.6%	121 47.5%	23 46.0%	5 83.3%	0 #DIV/0!	824 48.7%
リスク2個以上	人数 割合	2 40.0%	7 38.9%	391 51.2%	305 51.4%	134 52.5%	27 54.0%	1 16.7%	0 #DIV/0!	867 51.3%
合計	人数 割合	5 100.0%	18 100.0%	764 100.0%	593 100.0%	255 100.0%	50 100.0%	6 100.0%	0 #DIV/0!	1,691 100.0%

平成29年度 相双地域(女性)

[illegible]

非肥満		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
リスク1個以下	人数 割合	7 63.6%	9 64.3%	538 54.0%	346 49.0%	117 50.6%	12 31.6%	0 0.0%	0 #DIV/0!	1,029 51.5%
リスク2個以上	人数 割合	4 36.4%	5 35.7%	458 46.0%	360 51.0%	114 49.4%	26 68.4%	2 100.0%	0 #DIV/0!	969 48.5%
合計	人数 割合	11 100.0%	14 100.0%	996 100.0%	706 100.0%	231 100.0%	38 100.0%	2 100.0%	0 #DIV/0!	1,998 100.0%

[ 平成29年度 ]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成29年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	2	10	256	218	74	12	3	0	575
	割合	33.3%	45.5%	32.9%	36.3%	30.8%	24.0%	75.0%	0.0%	33.8%
非該当	人数	3	6	235	143	56	16	0	0	459
	割合	50.0%	27.3%	30.2%	23.8%	23.3%	32.0%	0.0%	0.0%	27.0%
予備群	人数	1	6	286	240	110	22	1	0	666
	割合	16.7%	27.3%	36.8%	39.9%	45.8%	44.0%	25.0%	0.0%	39.2%
有病者	人数	6	22	777	601	240	50	4	0	1,700
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
服薬なし	人数	4	5	219	150	65	12	1	0	456
	割合	80.0%	50.0%	44.2%	43.2%	47.1%	50.0%	25.0%	0.0%	44.6%
非該当	人数	1	4	151	110	35	6	3	0	310
	割合	20.0%	40.0%	30.5%	31.7%	25.4%	25.0%	75.0%	0.0%	30.3%
予備群	人数	0	1	125	87	38	6	0	0	257
	割合	0.0%	10.0%	25.3%	25.1%	27.5%	25.0%	0.0%	0.0%	25.1%
有病者	人数	5	10	495	347	138	24	4	0	1,023
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

平成29年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
服薬あり	人数	3	7	306	231	84	9	0	0	640
	割合	75.0%	43.8%	36.5%	33.2%	32.6%	25.7%	0.0%	0.0%	34.6%
非該当	人数	1	4	243	214	67	9	1	0	539
	割合	25.0%	25.0%	29.0%	30.8%	26.0%	25.7%	33.3%	0.0%	29.2%
予備群	人数	0	5	289	250	107	17	2	0	670
	割合	0.0%	31.3%	34.5%	36.0%	41.5%	48.6%	66.7%	0.0%	36.2%
有病者	人数	4	16	838	695	258	35	3	0	1,849
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%
服薬なし	人数	5	6	323	157	45	3	0	0	539
	割合	55.6%	75.0%	47.1%	39.3%	43.3%	27.3%	0.0%	0.0%	44.3%
非該当	人数	3	1	181	117	27	3	0	0	332
	割合	33.3%	12.5%	26.4%	29.3%	26.0%	27.3%	0.0%	0.0%	27.3%
予備群	人数	1	1	182	125	32	5	0	0	346
	割合	11.1%	12.5%	26.5%	31.3%	30.8%	45.5%	0.0%	0.0%	28.4%
有病者	人数	9	8	686	399	104	11	0	0	1,217
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%

[平成29年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成29年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成29年度 相双地域(女性)

[illegible]



[平成29年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成29年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成29年度 相双地域(女性)

[illegible]

[平成29年度]

(7)尿蛋白(+)以上の割合

平成29年度 相双地域(男性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数 割合	0 #DIV/0!	0 0.0%	2 3.1%	1 2.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	3 2.2%
尿蛋白(+)以上	人数 割合	0 #DIV/0!	1 100.0%	63 96.9%	39 97.5%	24 100.0%	4 100.0%	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	131 97.8%
合計	人数 割合	0 #DIV/0!	1 100.0%	65 100.0%	40 100.0%	24 100.0%	4 100.0%	0 #DIV/0!	0 #DIV/0!	134 100.0%

平成29年度 相双地域(女性)

		年代別								合計
		65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳～	
非該当	人数 割合	1 100.0%	0 0.0%	10 26.3%	5 20.0%	2 18.2%	1 25.0%	0 0.0%	0 #DIV/0!	19 23.2%
尿蛋白(+)以上	人数 割合	0 0.0%	2 100.0%	28 73.7%	20 80.0%	9 81.8%	3 75.0%	1 100.0%	0 #DIV/0!	63 76.8%
合計	人数 割合	1 100.0%	2 100.0%	38 100.0%	25 100.0%	11 100.0%	4 100.0%	1 100.0%	0 #DIV/0!	82 100.0%

〔平成29年度〕

#### (8)習慣的喫煙者の割合

平成29年度 相双地域(男性)

[illegible]

平成29年度 相双地域(女性)

[illegible]

(9)習慣的飲酒者の割合

平成29年度 相双地域(男性)



[illegible]

平成29年度 相双地域(女性)



[illegible]

[ 平成29年度 ]



(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合





(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合



(3)-① 高血圧症有病者等の割合





(3)-②-A 収縮期血圧高値の割合





[ 平成29年度 ]

(3)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(3)-②-C 血圧高値の割合





[ 平成29年度 ]



(4)-① 糖尿病有病者等の割合





(4)-②-A 空腹時血糖高値の割合



(4)-②-B HbA1c高値の割合





(4)-②-C 血糖高値の割合









(5)-① 脂質異常症有病者の割合





(5)-②-A 中性脂肪高値の割合





(5)-②-B HDLコレステロール低値の割合



(5)-②-C LDLコレステロール高値の割合





(5)-②-D 脂質異常の割合




[ 平成29年度 ]


(6)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合



(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





(9)‐③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合





[ 平成29年度 ]

(7)尿蛋白(+)以上の割合



(8)習慣的喫煙者の割合



(9)習慣的飲酒者の割合

