

■ ■ 二次医療圏標準化該当比 ■ ■

【県北】 福島市・二本松市・本宮市・伊達市・川俣町・桑折町・国見町・大玉村

【県中】 郡山市・須賀川市・田村市・鏡石町・天栄村・石川町・玉川村・平田村・
浅川町・古殿町・三春町・小野町

【県南】 白河市・棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町

【会津】 会津若松市・喜多方市・磐梯町・猪苗代町・北塩原村・西会津町・
会津坂下町・湯川村・柳津町・会津美里町・三島町・金山町・昭和村


【南会津】 南会津町・下郷町・只見町・桧枝岐村

【相双】 相馬市・南相馬市・広野町・富岡町・楡葉町・川内村・大熊町・双葉町・
浪江町・葛尾村・新地町・飯舘村

【いわき】 いわき市

県北(平成28年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	46,497	11,393	11,832.0	96.3	95.0	97.6	▽▽
メタボ予備群	46,497	8,378	8,243.5	101.6	100.0	103.3	▲▲
肥満者	46,580	24,391	24,868.4	98.1	97.4	98.8	▽▽
高血圧症有病者	46,583	21,419	21,847.1	98.0	97.2	98.8	▽▽
高血圧症予備群	43,993	6,089	6,275.3	97.0	95.2	98.9	▽▽
糖尿病有病者	46,583	5,439	5,740.3	94.8	92.8	96.8	▽▽
糖尿病予備群	38,574	5,508	5,350.0	103.0	100.9	105.1	▲▲
脂質異常症有病者	46,583	25,666	25,624.7	100.2	99.5	100.8	▲
習慣の喫煙者	46,579	15,588	17,208.5	90.6	89.6	91.6	▽▽
習慣の飲酒者	45,979	20,648	20,771.5	99.4	98.6	100.2	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ予備群, 糖尿病予備群,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, 肥満者, 高血圧症有病者, 高血圧症予備群, 糖尿病有病者, 習慣的喫煙者,

2)


収縮期血圧高値	43,995	19,672	20,549.8	95.7	94.9	96.6	▽▽
拡張期血圧高値	43,994	12,885	12,957.9	99.4	98.2	100.6	▽
血圧高値	43,995	21,851	22,714.1	96.2	95.4	97.0	▽▽
空腹時血糖高値	26,503	11,888	12,206.6	97.4	96.3	98.5	▽▽
HbA1c高値	27,418	13,545	13,184.8	102.7	101.7	103.8	▲▲
血糖高値	38,574	20,538	20,582.5	99.8	99.0	100.6	▽
中性脂肪高値	46,229	12,686	12,778.1	99.3	98.1	100.5	▽
HDL-C低値	46,231	3,773	3,842.3	98.2	95.7	100.7	▽
LDL-C高値	46,229	23,985	23,717.1	101.1	100.4	101.9	▲▲
脂質異常	46,234	30,012	30,183.8	99.4	98.9	100.0	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... LDL-C高値, HbA1c高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 脂質異常, 空腹時血糖高値,

県北(平成28年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	46,337	3,809	3,955.9	96.3	93.8	98.8	▽▽
メタボ予備群	46,337	2,563	2,644	97	94	100	▽
肥満者	46,385	12,195	12,751.0	95.6	94.4	96.9	▽▽
高血圧症有病者	46,392	15,300	15,862.5	96.5	95.4	97.5	▽▽
高血圧症予備群	42,757	5,238	5,432.2	96.4	94.4	98.5	▽▽
糖尿病有病者	46,392	2,711	2,764.5	98.1	95.1	101.2	▽
糖尿病予備群	40,528	5,550	5,306.8	104.6	102.5	106.7	▲▲
脂質異常症有病者	46,392	23,099	22,872.8	101.0	100.2	101.8	▲▲
習慣的喫煙者	46,389	3,376	4,436.5	76.1	74.0	78.3	▽▽
習慣的飲酒者	45,996	4,974	5,124.2	97.1	95.0	99.2	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 糖尿病予備群, 脂質異常症有病者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, 肥満者, 高血圧症有病者, 高血圧症予備群, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	42,761	14,384	15,217.2	94.5	93.5	95.6	▽▽
拡張期血圧高値	42,758	6,652	6,719.2	99.0	97.2	100.9	▽
血圧高値	42,762	15,568	16,433.3	94.7	93.7	95.7	▽▽
空腹時血糖高値	27,169	7,128	7,307.1	97.5	95.9	99.2	▽▽
HbA1c高値	32,283	16,333	15,754.9	103.7	102.7	104.6	▲▲
血糖高値	40,528	19,308	19,137.3	100.9	100.0	101.8	▲▲
中性脂肪高値	46,112	5,563	5,528.4	100.6	98.6	102.7	▲
HDL-C低値	46,111	604	647.0	93.3	87.3	99.9	▽▽
LDL-C高値	46,111	25,400	24,958.1	101.8	101.1	102.5	▲▲
脂質異常	46,112	27,471	27,157.7	101.2	100.5	101.8	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... HbA1c高値, 血糖高値, LDL-C高値, 脂質異常,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 空腹時血糖高値, HDL-C低値,

県中(平成28年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	35,220	9,011	9,110.6	98.9	97.4	100.5	▽
メタボ予備群	35,220	6,071	6,209.8	97.8	95.8	99.8	▽▽
肥満者	35,679	18,779	19,057.4	98.5	97.7	99.4	▽▽
高血圧症有病者	35,681	17,051	17,146.0	99.4	98.5	100.4	▽
高血圧症予備群	34,495	5,002	4,811.9	103.9	101.7	106.3	▲▲
糖尿病有病者	35,681	4,515	4,569.6	98.8	96.5	101.2	▽
糖尿病予備群	27,636	4,238	4,018.9	105.5	102.9	108.0	▲▲
脂質異常症有病者	35,681	19,187	19,546.8	98.2	97.3	99.0	▽▽
習慣的喫煙者	35,681	13,211	12,799.1	103.2	102.0	104.4	▲▲
習慣的飲酒者	32,393	14,700	14,753.0	99.6	98.6	100.7	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症予備群, 糖尿病予備群, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ予備群, 肥満者, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	34498	16,289	16,402.3	99.3	98.3	100.3	▽
拡張期血圧高値	34,495	10,223	9,868.6	103.6	102.1	105.1	▲▲
血圧高値	34,498	18,078	18,008.5	100.4	99.5	101.3	▲
空腹時血糖高値	21,707	10,338	10,309.1	100.3	99.1	101.5	▲
HbA1c高値	20,045	10,314	10,147.7	101.6	100.4	102.9	▲▲
血糖高値	27,636	15,806	15,226.8	103.8	102.9	104.7	▲▲
中性脂肪高値	34,905	9,484	9,498.1	99.9	98.4	101.4	▽
HDL-C低値	34,913	2,955	2,896.4	102.0	99.0	105.1	▲
LDL-C高値	34,858	17,224	17,655.5	97.6	96.7	98.5	▽▽
脂質異常	34,914	22,096	22,573.2	97.9	97.2	98.6	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 拡張期血圧高値, HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... LDL-C高値, 脂質異常,

県中(平成28年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	36,853	3,229	3,338.0	96.7	94.0	99.6	▽▽
メタボ予備群	36,853	2,056	2,119	97	94	101	▽
肥満者	36,998	10,278	10,304.5	99.7	98.3	101.2	▽
高血圧症有病者	37,000	13,243	13,323.4	99.4	98.2	100.6	▽
高血圧症予備群	34,525	4,567	4,435.7	103.0	100.6	105.4	▲▲
糖尿病有病者	37,000	2,347	2,370.2	99.0	95.7	102.5	▽
糖尿病予備群	30,256	4,668	4,342.4	107.5	105.1	110.0	▲▲
脂質異常症有病者	37,000	18,625	18,845.7	98.8	98.0	99.7	▽▽
習慣の喫煙者	37,000	3,516	3,317.3	106.0	103.1	108.9	▲▲
習慣の飲酒者	34,334	3,659	3,654.4	100.1	97.5	102.9	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症予備群, 糖尿病予備群, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	34,527	12,916	12,973.9	99.6	98.4	100.7	▽
拡張期血圧高値	34,525	5,670	5,410.4	104.8	102.7	107.0	▲▲
血圧高値	34,527	14,023	13,915.2	100.8	99.7	101.9	▲
空腹時血糖高値	23,695	7,024	7,039.9	99.8	98.1	101.5	▽
HbA1c高値	25,111	13,301	12,991.8	102.4	101.3	103.4	▲▲
血糖高値	30,256	15,841	15,262.9	103.8	102.8	104.8	▲▲
中性脂肪高値	36,491	4,568	4,506.0	101.4	99.0	103.8	▲
HDL-C低値	36,493	581	532.2	109.2	101.9	117.0	▲▲
LDL-C高値	36,436	19,442	19,865.7	97.9	97.1	98.7	▽▽
脂質異常	36,494	21,291	21,703.6	98.1	97.4	98.8	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 拡張期血圧高値, HbA1c高値, 血糖高値, HDL-C低値,
- ・有意に低い(▽▽) ... LDL-C高値, 脂質異常,

県南(平成28年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	10,570	2,728	2,810.3	97.1	94.1	100.1	▽
メタボ予備群	10,570	1,602	1,856.0	86.3	82.6	90.2	▽▽
肥満者	10,603	5,433	5,688.7	95.5	93.8	97.2	▽▽
高血圧症有病者	10,603	5,179	5,287.0	98.0	96.1	99.8	▽▽
高血圧症予備群	10,384	1,346	1,427.5	94.3	89.9	98.9	▽▽
糖尿病有病者	10,603	1,423	1,431.2	99.4	94.9	104.2	▽
糖尿病予備群	9,341	1,333	1,375.4	96.9	92.4	101.7	▽
脂質異常症有病者	10,603	5,785	5,812.3	99.5	97.9	101.2	▽
習慣的喫煙者	10,602	3,884	3,680.6	105.5	103.0	108.1	▲▲
習慣的飲酒者	10,349	4,694	4,775.3	98.3	96.3	100.3	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 習慣的喫煙者、
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ予備群、肥満者、高血圧症有病者、高血圧症予備群、

2)


収縮期血圧高値	10387	5,210	5,055.6	103.1	101.2	105.0	▲▲
拡張期血圧高値	10,384	2,867	2,967.6	96.6	93.8	99.6	▽▽
血圧高値	10,387	5,628	5,523.5	101.9	100.2	103.6	▲▲
空腹時血糖高値	7,306	3,821	3,553.9	107.5	105.3	109.8	▲▲
HbA1c高値	7,103	3,376	3,572.1	94.5	92.3	96.8	▽▽
血糖高値	9,341	5,420	5,199.7	104.2	102.5	106.0	▲▲
中性脂肪高値	10,491	2,913	2,826.9	103.0	100.0	106.2	▲▲
HDL-C低値	10,485	715	863.4	82.8	77.3	88.7	▽▽
LDL-C高値	10,492	5,181	5,259.5	98.5	96.7	100.4	▽
脂質異常	10,493	6,684	6,742.9	99.1	97.8	100.5	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値、血圧高値、中性脂肪高値、空腹時血糖高値、血糖高値、
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値、HDL-C低値、HbA1c高値、

県南(平成28年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	10,678	890	1,006.8	88.4	83.2	93.9	▽▽
メタボ予備群	10,678	476	620	77	70	84	▽▽
肥満者	10,698	2,971	3,011.0	98.7	95.8	101.6	▽
高血圧症有病者	10,699	4,067	3,994.3	101.8	99.5	104.2	▲
高血圧症予備群	10,548	1,183	1,372.7	86.2	81.8	90.8	▽▽
糖尿病有病者	10,699	738	719.1	102.6	96.0	109.7	▲
糖尿病予備群	9,605	1,277	1,394.1	91.6	87.2	96.2	▽▽
脂質異常症有病者	10,699	5,468	5,615.1	97.4	95.7	99.1	▽▽
習慣的喫煙者	10,698	908	905.9	100.2	94.4	106.4	▲
習慣的飲酒者	10,486	872	1,094.0	79.7	74.9	84.8	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ...
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 高血圧症予備群, 糖尿病予備群, 脂質異常症有病者, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	10,549	4,151	4,067.8	102.0	99.7	104.4	▲
拡張期血圧高値	10,548	1,558	1,669.7	93.3	89.3	97.5	▽▽
血圧高値	10,549	4,429	4,353.0	101.7	99.6	104.0	▲
空腹時血糖高値	8,167	2,775	2,435.6	113.9	110.7	117.3	▲▲
HbA1c高値	7,708	4,070	4,056.2	100.3	98.3	102.4	▲
血糖高値	9,605	5,260	4,889.9	107.6	105.7	109.5	▲▲
中性脂肪高値	10,600	1,271	1,343.0	94.6	90.0	99.5	▽▽
HDL-C低値	10,599	123	156.5	78.6	66.2	93.2	▽▽
LDL-C高値	10,604	5,719	5,860.3	97.6	95.9	99.3	▽▽
脂質異常	10,604	6,278	6,394.6	98.2	96.7	99.7	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 空腹時血糖高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常,

会津(平成28年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	20,495	5,360	5,391.0	99.4	97.3	101.6	▽
メタボ予備群	20,495	3,716	3,608.0	103.0	100.2	105.8	▲▲
肥満者	20,522	11,042	10,998.6	100.4	99.2	101.6	▲
高血圧症有病者	20,524	10,203	10,085.0	101.2	99.9	102.5	▲
高血圧症予備群	19,574	2,714	2,725.6	99.6	96.4	102.9	▽
糖尿病有病者	20,524	2,605	2,710.1	96.1	93.0	99.4	▽▽
糖尿病予備群	15,082	2,103	2,257.9	93.1	89.7	96.7	▽▽
脂質異常症有病者	20,524	11,201	11,264.5	99.4	98.3	100.6	▽
習慣的喫煙者	20,524	7,646	7,243.8	105.6	103.8	107.3	▲▲
習慣的飲酒者	20,253	9,518	9,295.5	102.4	101.0	103.8	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ予備群, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病有病者, 糖尿病予備群,

2)


収縮期血圧高値	19,574	9,894	9,408.4	105.2	103.8	106.5	▲▲
拡張期血圧高値	19,574	5,723	5,663.4	101.1	99.0	103.1	▲
血圧高値	19,574	10,612	10,317.8	102.9	101.6	104.1	▲▲
空腹時血糖高値	10,260	4,864	5,090.0	95.6	93.8	97.4	▽▽
HbA1c高値	13,387	6,145	6,639.7	92.5	91.0	94.1	▽▽
血糖高値	15,082	8,148	8,493.3	95.9	94.6	97.3	▽▽
中性脂肪高値	19,823	5,855	5,392.5	108.6	106.4	110.8	▲▲
HDL-C低値	19,827	1,711	1,636.9	104.5	100.2	109.0	▲▲
LDL-C高値	19,822	9,817	10,020.5	98.0	96.7	99.3	▽▽
脂質異常	19,827	12,994	12,816.3	101.4	100.4	102.3	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値, 脂質異常,
- ・有意に低い(▽▽) ... LDL-C高値, 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,

会津(平成28年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	21,803	2,044	2,016.5	101.4	97.6	105.3	▲
メタボ予備群	21,803	1,367	1,265	108	103	113	▲▲
肥満者	21,819	6,091	6,117.0	99.6	97.6	101.6	▽
高血圧症有病者	21,823	7,985	8,023.6	99.5	97.9	101.1	▽
高血圧症予備群	20,541	2,729	2,659.2	102.6	99.4	106.0	▲
糖尿病有病者	21,824	1,223	1,433.1	85.3	81.1	89.8	▽▽
糖尿病予備群	17,035	2,490	2,552.5	97.6	94.3	100.9	▽
脂質異常症有病者	21,824	10,742	11,330.1	94.8	93.6	96.0	▽▽
習慣的喫煙者	21,824	2,181	1,890.9	115.3	111.2	119.6	▲▲
習慣的飲酒者	21,494	2,531	2,274.3	111.3	107.6	115.1	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ予備群, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	20,548	8,060	7,767.8	103.8	102.1	105.4	▲▲
拡張期血圧高値	20,541	3,278	3,254.9	100.7	97.8	103.7	▲
血圧高値	20,548	8,528	8,332.1	102.4	100.8	103.9	▲▲
空腹時血糖高値	12,827	3,758	4,049.3	92.8	90.5	95.1	▽▽
HbA1c高値	15,636	7,495	8,066.4	92.9	91.5	94.3	▽▽
血糖高値	17,036	8,632	8,878.2	97.2	95.9	98.6	▽▽
中性脂肪高値	20,890	2,499	2,609.3	95.8	92.5	99.1	▽▽
HDL-C低値	20,890	286	303.3	94.3	84.7	105.0	▽
LDL-C高値	20,888	11,361	11,503.3	98.8	97.6	99.9	▽▽
脂質異常	20,890	12,405	12,539.5	98.9	97.9	100.0	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値, 中性脂肪高値, LDL-C高値, 脂質異常,

南会津(平成28年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	2,877	694	766.6	90.5	84.9	96.5	▽▽
メタボ予備群	2,877	480	505.5	95.0	87.6	103.0	▽
肥満者	2,885	1,566	1,549.6	101.1	97.8	104.5	▲
高血圧症有病者	2,885	1,478	1,442.1	102.5	98.9	106.2	▲
高血圧症予備群	2,743	355	379.7	93.5	84.9	102.9	▽
糖尿病有病者	2,885	236	389.7	60.6	53.6	68.4	▽▽
糖尿病予備群	2,181	262	330.9	79.2	70.7	88.6	▽▽
脂質異常症有病者	2,885	1,656	1,585.4	104.5	101.2	107.8	▲▲
習慣的喫煙者	2,875	1,119	998.8	112.0	107.1	117.2	▲▲
習慣的飲酒者	2,832	1,466	1,305.3	112.3	108.4	116.3	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 脂質異常症有病者, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群,

2)


収縮期血圧高値	2743	1,477	1,331.4	110.9	107.2	114.8	▲▲
拡張期血圧高値	2,743	844	795.1	106.2	100.4	112.2	▲▲
血圧高値	2,743	1,579	1,458.0	108.3	104.9	111.8	▲▲
空腹時血糖高値	1,235	551	628.9	87.6	82.4	93.2	▽▽
HbA1c高値	2,100	893	1,039.8	85.9	81.8	90.2	▽▽
血糖高値	2,181	1,095	1,240.3	88.3	84.7	92.0	▽▽
中性脂肪高値	2,865	821	774.4	106.0	100.1	112.3	▲▲
HDL-C低値	2,868	175	236.5	74.0	64.2	85.3	▽▽
LDL-C高値	2,868	1,403	1,440.5	97.4	93.9	101.1	▽
脂質異常	2,868	1,846	1,846.5	100.0	97.3	102.7	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... HDL-C低値, 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,

南会津(平成28年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	2,635	223	255.2	87.4	77.2	99.0	▽▽
メタボ予備群	2,635	120	154	78	65	93	▽▽
肥満者	2,636	771	748.0	103.1	97.2	109.3	▲
高血圧症有病者	2,636	1,052	1,011.2	104.0	99.3	109.0	▲
高血圧症予備群	2,515	303	328.3	92.3	83.1	102.5	▽
糖尿病有病者	2,636	144	182.8	78.8	67.3	92.2	▽▽
糖尿病予備群	2,167	304	333.8	91.1	82.1	101.0	▽
脂質異常症有病者	2,636	1,366	1,406.5	97.1	93.6	100.7	▽
習慣の喫煙者	2,625	217	213.6	101.6	89.5	115.3	▲
習慣の飲酒者	2,588	266	265.5	100.2	89.5	112.2	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ...
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 糖尿病有病者,

2)


収縮期血圧高値	2,515	1,118	986.0	113.4	108.6	118.4	▲▲
拡張期血圧高値	2,515	437	399.1	109.5	100.6	119.1	▲▲
血圧高値	2,515	1,177	1,053.1	111.8	107.2	116.5	▲▲
空腹時血糖高値	1,684	509	542.6	93.8	87.3	100.8	▽
HbA1c高値	2,009	966	1,058.0	91.3	87.3	95.5	▽▽
血糖高値	2,167	1,113	1,153.1	96.5	92.7	100.5	▽
中性脂肪高値	2,609	246	335.0	73.4	65.3	82.6	▽▽
HDL-C低値	2,609	23	39.1	58.9	39.3	88.2	▽▽
LDL-C高値	2,609	1,355	1,449.2	93.5	90.1	97.0	▽▽
脂質異常	2,609	1,480	1,582.9	93.5	90.4	96.7	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... HbA1c高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常,

相双(平成28年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						結果
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		
					下限値	上限値	
メタボ該当者	13,085	4,019	3,549.3	113.2	110.5	116.0	▲▲
メタボ予備群	13,085	2,168	2,288.5	94.7	91.3	98.3	▽▽
肥満者	13,086	7,538	7,040.2	107.1	105.6	108.6	▲▲
高血圧症有病者	13,088	7,090	6,708.8	105.7	104.1	107.3	▲▲
高血圧症予備群	12,349	1,505	1,677.0	89.7	85.7	93.9	▽▽
糖尿病有病者	13,088	2,148	1,838.4	116.8	112.6	121.2	▲▲
糖尿病予備群	12,062	1,834	1,821.4	100.7	96.7	104.8	▲
脂質異常症有病者	13,087	7,566	7,167.5	105.6	104.1	107.0	▲▲
習慣的喫煙者	13,087	4,566	4,405.4	103.6	101.4	106.0	▲▲
習慣的飲酒者	11,903	5,643	5,542.7	101.8	100.0	103.7	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ該当者, 肥満者, 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ予備群, 高血圧症予備群,

2)


収縮期血圧高値	12,349	6,288	6,097.1	103.1	101.4	104.9	▲▲
拡張期血圧高値	12,349	3,737	3,503.7	106.7	104.0	109.4	▲▲
血圧高値	12,349	6,984	6,638.0	105.2	103.7	106.8	▲▲
空腹時血糖高値	9,295	4,875	4,525.4	107.7	105.8	109.7	▲▲
HbA1c高値	9,198	4,703	4,732.7	99.4	97.5	101.3	▽
血糖高値	12,063	7,138	6,839.0	104.4	102.9	105.9	▲▲
中性脂肪高値	12,769	3,747	3,404.6	110.1	107.3	112.9	▲▲
HDL-C低値	12,770	975	1,047.5	93.1	87.8	98.6	▽▽
LDL-C高値	12,757	6,595	6,331.7	104.2	102.5	105.8	▲▲
脂質異常	12,770	8,501	8,152.7	104.3	103.1	105.5	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値, LDL-C高値, 脂質異常, 空腹時血糖高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... HDL-C低値,

相双(平成28年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						結果
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		
					下限値	上限値	
メタボ該当者	14,048	1,717	1,370.3	125.3	120.2	130.6	▲▲
メタボ予備群	14,048	883	826	107	101	114	▲▲
肥満者	14,048	4,554	3,994.5	114.0	111.5	116.6	▲▲
高血圧症有病者	14,047	5,712	5,416.2	105.5	103.5	107.5	▲▲
高血圧症予備群	13,339	1,701	1,756.8	96.8	92.8	101.0	▽
糖尿病有病者	14,048	1,220	982.8	124.1	118.0	130.5	▲▲
糖尿病予備群	13,185	1,899	1,952.4	97.3	93.5	101.2	▽
脂質異常症有病者	14,048	8,111	7,577.2	107.0	105.6	108.5	▲▲
習慣的喫煙者	14,048	1,112	1,122.8	99.0	93.8	104.5	▽
習慣的飲酒者	12,785	1,148	1,295.9	88.6	84.0	93.4	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 肥満者, 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	13,340	5,498	5,274.2	104.2	102.3	106.3	▲▲
拡張期血圧高値	13,339	2,160	2,134.0	101.2	97.6	105.0	▲
血圧高値	13,340	5,885	5,631.6	104.5	102.6	106.4	▲▲
空腹時血糖高値	10,382	3,373	3,139.7	107.4	104.7	110.3	▲▲
HbA1c高値	11,343	5,889	5,933.2	99.3	97.6	100.9	▽
血糖高値	13,187	6,995	6,822.0	102.5	101.0	104.1	▲▲
中性脂肪高値	13,567	2,047	1,764.3	116.0	111.7	120.5	▲▲
HDL-C低値	13,567	221	202.4	109.2	96.4	123.6	▲
LDL-C高値	13,562	7,733	7,610.2	101.6	100.2	103.0	▲▲
脂質異常	13,567	8,534	8,309.1	102.7	101.4	104.0	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 空腹時血糖高値, 血糖高値, 中性脂肪高値, LDL-C高値, 脂質異常,
- ・有意に低い(▽▽) ...

いわき(平成28年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	23,314	6,206	5,951.2	104.3	102.3	106.3	▲▲
メタボ予備群	23,314	4,423	4,126.7	107.2	104.6	109.8	▲▲
肥満者	23,330	12,906	12,452.1	103.6	102.6	104.8	▲▲
高血圧症有病者	23,330	11,095	10,999.2	100.9	99.6	102.1	▲
高血圧症予備群	22,378	3,435	3,149.1	109.1	106.1	112.2	▲▲
糖尿病有病者	23,330	3,218	2,904.6	110.8	107.6	114.1	▲▲
糖尿病予備群	18,916	2,525	2,648.4	95.3	92.2	98.6	▽▽
脂質異常症有病者	23,330	12,740	12,799.8	99.5	98.5	100.6	▽
習慣的喫煙者	23,330	8,869	8,546.8	103.8	102.2	105.3	▲▲
習慣的飲酒者	22,093	9,782	10,007.8	97.7	96.4	99.1	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 肥満者, 高血圧症予備群, 糖尿病有病者, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病予備群, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	22,379	10,572	10,557.3	100.1	98.9	101.4	▲
拡張期血圧高値	22,378	5,941	6,463.8	91.9	90.1	93.8	▽▽
血圧高値	22,379	11,548	11,620.2	99.4	98.2	100.5	▽
空腹時血糖高値	9,309	4,058	4,081.1	99.4	97.3	101.6	▽
HbA1c高値	11,913	6,193	5,852.2	105.8	104.1	107.5	▲▲
血糖高値	18,916	9,588	10,151.4	94.5	93.2	95.7	▽▽
中性脂肪高値	21,776	6,207	5,957.1	104.2	102.2	106.2	▲▲
HDL-C低値	21,777	2,025	1,806.0	112.1	107.9	116.5	▲▲
LDL-C高値	21,713	11,265	11,045.2	102.0	100.8	103.2	▲▲
脂質異常	21,778	14,310	14,127.6	101.3	100.4	102.2	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 中性脂肪高値, HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常, HbA1c高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, 血糖高値,

いわき(平成28年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	21,749	2,000	1,969.4	101.6	97.7	105.6	▲
メタボ予備群	21,749	1,414	1,251	113	108	118	▲▲
肥満者	21,750	6,127	6,060.9	101.1	99.1	103.1	▲
高血圧症有病者	21,753	8,115	7,842.8	103.5	101.8	105.1	▲▲
高血圧症予備群	21,120	2,982	2,718.1	109.7	106.4	113.1	▲▲
糖尿病有病者	21,753	1,464	1,394.6	105.0	100.3	109.9	▲▲
糖尿病予備群	19,174	2,342	2,648.0	88.4	85.4	91.6	▽▽
脂質異常症有病者	21,753	11,321	11,084.7	102.1	100.9	103.3	▲▲
習慣的喫煙者	21,753	2,524	1,947.0	129.6	125.4	134.0	▲▲
習慣的飲酒者	21,028	2,501	2,242.7	111.5	107.8	115.4	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ予備群, 高血圧症有病者, 高血圧症予備群, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病予備群,

2)

収縮期血圧高値	21,121	8,125	7,965.1	102.0	100.4	103.6	▲▲
拡張期血圧高値	21,121	3,149	3,316.7	94.9	92.1	97.8	▽▽
血圧高値	21,122	8,649	8,540.9	101.3	99.8	102.8	▲
空腹時血糖高値	7,645	1,737	1,789.7	97.1	93.3	101.0	▽
HbA1c高値	14,315	7,114	7,307.4	97.4	95.9	98.9	▽▽
血糖高値	19,175	8,400	9,405.7	89.3	88.0	90.6	▽▽
中性脂肪高値	20,816	2,844	2,586.0	110.0	106.6	113.5	▲▲
HDL-C低値	20,816	348	305.4	113.9	103.5	125.4	▲▲
LDL-C高値	20,802	11,608	11,371.3	102.1	100.9	103.2	▲▲
脂質異常	20,816	12,644	12,415.6	101.8	100.8	102.9	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, HbA1c高値, 血糖高値,