

■ ■ 二次医療圏標準化該当比 ■ ■

【県北】 福島市・二本松市・本宮市・伊達市・川俣町・桑折町・国見町・大玉村

【県中】 郡山市・須賀川市・田村市・鏡石町・天栄村・石川町・玉川村・平田村・
浅川町・古殿町・三春町・小野町

【県南】 白河市・棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町

【会津】 会津若松市・喜多方市・磐梯町・猪苗代町・北塩原村・西会津町・
会津坂下町・湯川村・柳津町・会津美里町・三島町・金山町・昭和村


【南会津】 南会津町・下郷町・只見町・桧枝岐村

【相双】 相馬市・南相馬市・広野町・富岡町・楡葉町・川内村・大熊町・双葉町・
浪江町・葛尾村・新地町・飯舘村

【いわき】 いわき市

県北(平成27年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	44,949	10,382	11,344.0	91.5	90.2	92.8	▽▽
メタボ予備群	44,949	7,821	8,051.0	97.1	95.5	98.8	▽▽
肥満者	44,975	23,764	24,019.3	98.9	98.2	99.7	▽▽
高血圧症有病者	44,993	20,314	20,628.2	98.5	97.6	99.3	▽▽
高血圧症予備群	42,310	6,002	6,265.1	95.8	93.9	97.7	▽▽
糖尿病有病者	44,993	5,313	5,674.9	93.6	91.6	95.6	▽▽
糖尿病予備群	37,925	5,233	5,575.9	93.8	91.9	95.8	▽▽
脂質異常症有病者	44,993	24,896	24,942.7	99.8	99.1	100.5	▽
習慣の喫煙者	44,993	15,030	16,751.9	89.7	88.7	90.7	▽▽
習慣の飲酒者	44,567	20,075	20,346.7	98.7	97.8	99.5	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ...
- ・有意に低い(▽▽) ...

メタボ該当者、メタボ予備群、肥満者、高血圧症有病者、高血圧症予備群、糖尿病有病者、糖尿病予備群、習慣的喫煙者、習慣的飲酒者、

2)


収縮期血圧高値	42312	18,898	19,436.3	97.2	96.4	98.1	▽▽
拡張期血圧高値	42,311	12,208	11,973.4	102.0	100.7	103.2	▲▲
血圧高値	42,313	20,857	21,289.2	98.0	97.2	98.8	▽▽
空腹時血糖高値	26,175	11,174	11,844.0	94.3	93.3	95.4	▽▽
HbA1c高値	26,457	13,144	13,175.9	99.8	98.7	100.8	▽
血糖高値	37,925	19,840	20,599.1	96.3	95.6	97.1	▽▽
中性脂肪高値	44,748	12,337	12,614.8	97.8	96.6	99.0	▽▽
HDL-C低値	44,770	3,800	4,085.8	93.0	90.7	95.4	▽▽
LDL-C高値	44,767	23,516	23,290.6	101.0	100.2	101.7	▲▲
脂質異常	44,772	29,415	29,467.6	99.8	99.3	100.4	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 拡張期血圧高値、LDL-C高値、
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値、血圧高値、中性脂肪高値、HDL-C低値、空腹時血糖高値、血糖高値、

県北(平成27年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	45,764	3,590	3,938.7	91.1	88.7	93.6	▽▽
メタボ予備群	45,764	2,623	2,773	95	92	98	▽▽
肥満者	45,791	12,623	12,796.6	98.6	97.4	99.9	▽▽
高血圧症有病者	45,826	14,854	15,316.9	97.0	95.9	98.1	▽▽
高血圧症予備群	42,076	5,411	5,535.8	97.7	95.7	99.8	▽▽
糖尿病有病者	45,826	2,612	2,870.2	91.0	88.1	94.0	▽▽
糖尿病予備群	40,201	5,175	5,380.3	96.2	94.1	98.3	▽▽
脂質異常症有病者	45,826	23,135	23,033.6	100.4	99.7	101.2	▲
習慣的喫煙者	45,826	3,308	4,527.3	73.1	71.0	75.2	▽▽
習慣的飲酒者	45,398	4,849	5,131.7	94.5	92.4	96.6	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ...
- ・有意に低い(▽▽) ...

メタボ該当者、メタボ予備群、肥満者、高血圧症有病者、高血圧症予備群、糖尿病有病者、糖尿病予備群、習慣的喫煙者、習慣的飲酒者、

2)

収縮期血圧高値	42,078	14,336	14,673.7	97.7	96.6	98.8	▽▽
拡張期血圧高値	42,077	6,541	6,304.5	103.8	101.8	105.7	▲▲
血圧高値	42,079	15,339	15,617.9	98.2	97.2	99.3	▽▽
空腹時血糖高値	26,874	6,704	7,162.5	93.6	92.0	95.3	▽▽
HbA1c高値	31,644	15,577	15,456.2	100.8	99.8	101.7	▲
血糖高値	40,201	18,441	18,921.0	97.5	96.6	98.3	▽▽
中性脂肪高値	45,547	5,529	5,671.6	97.5	95.5	99.5	▽▽
HDL-C低値	45,585	700	838.3	83.5	78.4	89.0	▽▽
LDL-C高値	45,584	25,500	25,149.4	101.4	100.7	102.1	▲▲
脂質異常	45,585	27,424	27,235.7	100.7	100.1	101.3	▲▲


福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ...
- ・有意に低い(▽▽) ...

拡張期血圧高値、LDL-C高値、脂質異常、
収縮期血圧高値、血圧高値、空腹時血糖高値、血糖高値、中性脂肪高値、HDL-C低値、

県中(平成27年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	33,478	8,767	8,614.1	101.8	100.2	103.4	▲▲
メタボ予備群	33,478	5,833	5,974.9	97.6	95.6	99.6	▽▽
肥満者	33,500	17,622	17,910.9	98.4	97.5	99.3	▽▽
高血圧症有病者	33,505	15,854	15,806.8	100.3	99.3	101.3	▲
高血圧症予備群	32,193	4,599	4,696.1	97.9	95.7	100.3	▽
糖尿病有病者	33,505	4,382	4,403.5	99.5	97.1	102.0	▽
糖尿病予備群	26,419	4,331	4,036.5	107.3	104.8	109.9	▲▲
脂質異常症有病者	33,505	18,280	18,509.3	98.8	97.9	99.6	▽▽
習慣的喫煙者	33,505	12,404	12,086.4	102.6	101.4	103.9	▲▲
習慣的飲酒者	30,159	13,882	13,926.0	99.7	98.6	100.8	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ該当者, 糖尿病予備群, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ予備群, 肥満者, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	32193	14,865	15,156.7	98.1	97.1	99.1	▽▽
拡張期血圧高値	32,194	9,278	8,847.8	104.9	103.3	106.4	▲▲
血圧高値	32,194	16,375	16,471.9	99.4	98.5	100.4	▽
空腹時血糖高値	21,483	10,105	10,060.0	100.4	99.2	101.7	▲
HbA1c高値	19,533	10,198	10,040.8	101.6	100.4	102.8	▲▲
血糖高値	26,419	15,313	14,765.0	103.7	102.8	104.7	▲▲
中性脂肪高値	33,271	9,221	9,225.8	99.9	98.4	101.5	▽
HDL-C低値	33,291	3,028	3,033.7	99.8	96.9	102.8	▽
LDL-C高値	33,247	16,612	17,084.9	97.2	96.3	98.2	▽▽
脂質異常	33,292	21,292	21,715.1	98.1	97.4	98.7	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 拡張期血圧高値, HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, LDL-C高値, 脂質異常,

県中(平成27年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	34,868	3,140	3,234.3	97.1	94.3	100.0	▽▽
メタボ予備群	34,868	1,981	2,138	93	89	96	▽▽
肥満者	34,883	9,674	9,902.5	97.7	96.3	99.2	▽▽
高血圧症有病者	34,886	12,369	12,496.9	99.0	97.8	100.2	▽
高血圧症予備群	32,381	4,247	4,359.1	97.4	95.1	99.9	▽▽
糖尿病有病者	34,886	2,324	2,377.3	97.8	94.5	101.2	▽
糖尿病予備群	28,668	4,749	4,237.1	112.1	109.6	114.6	▲▲
脂質異常症有病者	34,886	18,073	18,325.5	98.6	97.8	99.5	▽▽
習慣的喫煙者	34,886	3,295	3,152.0	104.5	101.6	107.5	▲▲
習慣的飲酒者	32,367	3,412	3,441.9	99.1	96.4	101.9	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 糖尿病予備群, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 肥満者, 高血圧症予備群, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	32,383	11,767	12,141.9	96.9	95.7	98.1	▽▽
拡張期血圧高値	32,381	4,910	4,866.1	100.9	98.7	103.2	▲
血圧高値	32,383	12,578	12,827.7	98.1	96.9	99.2	▽▽
空腹時血糖高値	23,072	6,676	6,841.0	97.6	95.9	99.3	▽▽
HbA1c高値	24,344	13,115	12,517.5	104.8	103.7	105.9	▲▲
血糖高値	28,668	15,327	14,543.3	105.4	104.4	106.4	▲▲
中性脂肪高値	34,536	4,532	4,458.2	101.7	99.3	104.1	▲
HDL-C低値	34,544	583	650.3	89.7	83.5	96.3	▽▽
LDL-C高値	34,491	18,734	19,275.5	97.2	96.4	98.0	▽▽
脂質異常	34,546	20,489	20,958.5	97.8	97.0	98.5	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 空腹時血糖高値, HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常,

県南(平成27年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						結果
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		
					下限値	上限値	
メタボ該当者	9,935	2,576	2,629.7	98.0	94.9	101.2	▽
メタボ予備群	9,935	1,660	1,767.2	93.9	90.0	98.0	▽▽
肥満者	9,944	5,134	5,335.1	96.2	94.5	98.0	▽▽
高血圧症有病者	9,946	4,607	4,874.8	94.5	92.6	96.5	▽▽
高血圧症予備群	9,702	1,524	1,402.4	108.7	104.0	113.6	▲▲
糖尿病有病者	9,946	1,473	1,377.1	107.0	102.2	111.9	▲▲
糖尿病予備群	9,117	1,487	1,413.7	105.2	100.6	110.0	▲▲
脂質異常症有病者	9,946	5,461	5,493.2	99.4	97.7	101.1	▽
習慣の喫煙者	9,946	3,661	3,460.9	105.8	103.2	108.4	▲▲
習慣の飲酒者	9,759	4,528	4,560.4	99.3	97.3	101.4	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症予備群, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ予備群, 肥満者, 高血圧症有病者,

2)


収縮期血圧高値	9702	4,667	4,683.4	99.6	97.7	101.7	▽
拡張期血圧高値	9,702	2,349	2,650.7	88.6	85.6	91.7	▽▽
血圧高値	9,702	4,979	5,061.8	98.4	96.5	100.2	▽
空腹時血糖高値	7,593	3,983	3,620.0	110.0	107.8	112.3	▲▲
HbA1c高値	6,853	3,603	3,529.0	102.1	99.9	104.3	▲
血糖高値	9,117	5,584	5,153.8	108.3	106.7	110.1	▲▲
中性脂肪高値	9,898	2,675	2,708.2	98.8	95.7	101.9	▽
HDL-C低値	9,911	827	896.8	92.2	86.6	98.2	▽▽
LDL-C高値	9,915	4,954	5,039.3	98.3	96.5	100.2	▽
脂質異常	9,919	6,327	6,424.6	98.5	97.1	99.9	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 空腹時血糖高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, HDL-C低値, 脂質異常,

県南(平成27年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	10,156	939	968.9	96.9	91.4	102.8	▽
メタボ予備群	10,156	485	628	77	71	84	▽▽
肥満者	10,157	2,841	2,900.3	98.0	95.0	101.0	▽
高血圧症有病者	10,159	3,656	3,732.5	98.0	95.5	100.4	▽
高血圧症予備群	9,912	1,280	1,349.2	94.9	90.3	99.7	▽▽
糖尿病有病者	10,159	774	713.8	108.4	101.6	115.7	▲▲
糖尿病予備群	9,567	1,472	1,390.0	105.9	101.2	110.8	▲▲
脂質異常症有病者	10,159	5,439	5,454.7	99.7	98.0	101.5	▽
習慣的喫煙者	10,159	890	880.6	101.1	95.1	107.4	▲
習慣的飲酒者	9,988	826	1,051.5	78.6	73.7	83.7	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 糖尿病有病者, 糖尿病予備群,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ予備群, 高血圧症予備群, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	9,914	3,793	3,779.5	100.4	98.0	102.8	▲
拡張期血圧高値	9,912	1,313	1,505.7	87.2	83.1	91.6	▽▽
血圧高値	9,914	3,933	3,988.6	98.6	96.3	100.9	▽
空腹時血糖高値	8,350	2,885	2,442.0	118.1	114.9	121.5	▲▲
HbA1c高値	7,531	4,173	3,897.9	107.1	105.0	109.2	▲▲
血糖高値	9,567	5,270	4,796.9	109.9	108.0	111.8	▲▲
中性脂肪高値	10,072	1,350	1,323.9	102.0	97.2	107.0	▲
HDL-C低値	10,093	176	190.3	92.5	80.3	106.6	▽
LDL-C高値	10,101	5,727	5,709.5	100.3	98.7	102.0	▲
脂質異常	10,103	6,244	6,199.1	100.7	99.2	102.2	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値,

会津(平成27年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	20,280	5,225	5,307.1	98.5	96.3	100.6	▽
メタボ予備群	20,280	3,579	3,615.3	99.0	96.3	101.8	▽
肥満者	20,288	10,638	10,876.5	97.8	96.6	99.0	▽▽
高血圧症有病者	20,290	9,757	9,779.9	99.8	98.5	101.1	▽
高血圧症予備群	19,185	2,867	2,799.2	102.4	99.3	105.7	▲
糖尿病有病者	20,290	2,542	2,743.2	92.7	89.6	95.9	▽▽
糖尿病予備群	14,992	2,296	2,348.9	97.7	94.4	101.2	▽
脂質異常症有病者	20,290	11,094	11,231.3	98.8	97.6	99.9	▽▽
習慣的喫煙者	20,290	7,672	7,209.4	106.4	104.7	108.2	▲▲
習慣的飲酒者	19,953	9,614	9,277.0	103.6	102.3	105.0	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 肥満者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	19186	9,506	9,127.8	104.1	102.8	105.5	▲▲
拡張期血圧高値	19,185	5,136	5,339.0	96.2	94.1	98.3	▽▽
血圧高値	19,186	10,102	9,910.5	101.9	100.7	103.2	▲▲
空腹時血糖高値	10,350	4,737	5,050.8	93.8	92.0	95.6	▽▽
HbA1c高値	13,563	6,475	6,881.7	94.1	92.6	95.6	▽▽
血糖高値	14,992	8,404	8,541.2	98.4	97.1	99.7	▽▽
中性脂肪高値	19,744	5,878	5,467.4	107.5	105.4	109.7	▲▲
HDL-C低値	19,743	1,818	1,787.3	101.7	97.7	105.9	▲
LDL-C高値	19,736	9,927	10,119.6	98.1	96.8	99.4	▽▽
脂質異常	19,746	13,001	12,872.5	101.0	100.1	101.9	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値, 脂質異常,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, LDL-C高値, 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値,

会津(平成27年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	21,567	1,931	2,033.0	95.0	91.3	98.8	▽▽
メタボ予備群	21,567	1,321	1,331	99	95	104	▽
肥満者	21,576	5,983	6,148.9	97.3	95.4	99.3	▽▽
高血圧症有病者	21,582	7,714	7,856.0	98.2	96.6	99.8	▽▽
高血圧症予備群	20,183	2,777	2,729.6	101.7	98.5	105.0	▲
糖尿病有病者	21,582	1,306	1,495.1	87.4	83.2	91.7	▽▽
糖尿病予備群	17,284	2,327	2,606.9	89.3	86.2	92.5	▽▽
脂質異常症有病者	21,582	10,991	11,491.1	95.6	94.5	96.8	▽▽
習慣的喫煙者	21,582	2,193	1,901.0	115.4	111.2	119.6	▲▲
習慣的飲酒者	21,374	2,475	2,273.3	108.9	105.2	112.6	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, 肥満者, 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	20,184	7,750	7,567.1	102.4	100.8	104.1	▲▲
拡張期血圧高値	20,183	2,914	3,062.4	95.2	92.2	98.2	▽▽
血圧高値	20,184	8,085	7,999.5	101.1	99.5	102.7	▲
空腹時血糖高値	13,424	3,820	4,167.2	91.7	89.4	94.0	▽▽
HbA1c高値	15,937	7,473	8,145.3	91.7	90.4	93.2	▽▽
血糖高値	17,284	8,694	8,911.1	97.6	96.2	98.9	▽▽
中性脂肪高値	20,848	2,508	2,712.9	92.4	89.3	95.7	▽▽
HDL-C低値	20,849	408	391.1	104.3	95.5	114.0	▲
LDL-C高値	20,846	11,649	11,735.2	99.3	98.2	100.4	▽
脂質異常	20,850	12,655	12,736.3	99.4	98.4	100.4	▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, 空腹時血糖高値, HbA1c高値, 血糖高値, 中性脂肪高値,

南会津(平成27年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	2,887	712	759.1	93.8	88.1	99.9	▽▽
メタボ予備群	2,887	508	514.3	98.8	91.4	106.8	▽
肥満者	2,888	1,469	1,549.6	94.8	91.5	98.2	▽▽
高血圧症有病者	2,889	1,398	1,402.8	99.7	96.0	103.4	▽
高血圧症予備群	2,737	435	398.9	109.1	100.1	118.8	▲▲
糖尿病有病者	2,889	284	393.6	72.2	64.7	80.5	▽▽
糖尿病予備群	2,246	316	354.1	89.2	80.7	98.8	▽▽
脂質異常症有病者	2,889	1,608	1,600.4	100.5	97.3	103.8	▲
習慣的喫煙者	2,889	1,151	1,019.4	112.9	108.0	118.0	▲▲
習慣的飲酒者	2,764	1,419	1,285.2	110.4	106.5	114.4	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 高血圧症予備群, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, 肥満者, 糖尿病有病者, 糖尿病予備群,

2)


収縮期血圧高値	2737	1,453	1,307.9	111.1	107.3	115.0	▲▲
拡張期血圧高値	2,737	749	762.7	98.2	92.4	104.3	▽
血圧高値	2,737	1,532	1,419.5	107.9	104.4	111.5	▲▲
空腹時血糖高値	1,292	568	638.8	88.9	83.6	94.5	▽▽
HbA1c高値	2,130	1,038	1,079.8	96.1	92.1	100.4	▽
血糖高値	2,246	1,280	1,285.1	99.6	96.1	103.2	▽
中性脂肪高値	2,877	834	794.5	105.0	99.2	111.1	▲
HDL-C低値	2,879	219	261.0	83.9	74.0	95.2	▽▽
LDL-C高値	2,879	1,376	1,471.7	93.5	90.0	97.1	▽▽
脂質異常	2,879	1,814	1,873.3	96.8	94.2	99.6	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常, 空腹時血糖高値,

南会津(平成27年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	2,651	223	261.8	85.2	75.2	96.5	▽▽
メタボ予備群	2,651	113	165	69	57	82	▽▽
肥満者	2,650	780	763.6	102.1	96.3	108.3	▲
高血圧症有病者	2,651	1,045	1,010.3	103.4	98.7	108.4	▲
高血圧症予備群	2,518	346	344.1	100.6	91.3	110.8	▲
糖尿病有病者	2,651	154	193.3	79.7	68.4	92.7	▽▽
糖尿病予備群	2,239	322	348.8	92.3	83.5	102.0	▽
脂質異常症有病者	2,651	1,358	1,448.0	93.8	90.4	97.3	▽▽
習慣の喫煙者	2,651	241	218.7	110.2	97.8	124.2	▲
習慣の飲酒者	2,549	319	261.0	122.2	110.4	135.3	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... メタボ該当者, メタボ予備群, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,

2)


収縮期血圧高値	2,518	1,111	983.4	113.0	108.2	118.0	▲▲
拡張期血圧高値	2,518	356	381.3	93.4	84.9	102.7	▽
血圧高値	2,518	1,135	1,035.3	109.6	105.0	114.4	▲▲
空腹時血糖高値	1,790	556	567.8	97.9	91.5	104.8	▽
HbA1c高値	2,106	1,024	1,094.2	93.6	89.6	97.7	▽▽
血糖高値	2,239	1,170	1,182.9	98.9	95.1	102.9	▽
中性脂肪高値	2,625	279	349.6	79.8	71.5	89.1	▽▽
HDL-C低値	2,625	26	50.2	51.8	35.4	75.9	▽▽
LDL-C高値	2,625	1,401	1,485.9	94.3	91.0	97.7	▽▽
脂質異常	2,625	1,516	1,616.0	93.8	90.8	96.9	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... HbA1c高値, 中性脂肪高値, HDL-C低値, LDL-C高値, 脂質異常,

相双(平成27年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						結果
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		
					下限値	上限値	
メタボ該当者	12,274	3,918	3,296.1	118.9	116.0	121.8	▲▲
メタボ予備群	12,274	2,196	2,179.3	100.8	97.2	104.5	▲
肥満者	12,276	7,215	6,598.3	109.3	107.8	110.9	▲▲
高血圧症有病者	12,280	6,503	6,136.1	106.0	104.3	107.7	▲▲
高血圧症予備群	11,573	1,537	1,665.6	92.3	88.2	96.5	▽▽
糖尿病有病者	12,280	2,004	1,744.7	114.9	110.6	119.3	▲▲
糖尿病予備群	11,127	1,718	1,762.2	97.5	93.5	101.6	▽
脂質異常症有病者	12,280	7,317	6,781.3	107.9	106.4	109.4	▲▲
習慣的喫煙者	12,279	4,385	4,188.4	104.7	102.3	107.1	▲▲
習慣的飲酒者	11,179	5,329	5,262.2	101.3	99.4	103.2	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ該当者, 肥満者, 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 高血圧症予備群,

2)


収縮期血圧高値	11,575	5,974	5,648.4	105.8	104.0	107.6	▲▲
拡張期血圧高値	11,573	3,312	3,152.6	105.1	102.2	108.0	▲▲
血圧高値	11,575	6,441	6,090.8	105.8	104.1	107.4	▲▲
空腹時血糖高値	8,585	4,558	4,127.2	110.4	108.4	112.5	▲▲
HbA1c高値	8,806	4,414	4,582.4	96.3	94.4	98.2	▽▽
血糖高値	11,127	6,670	6,392.0	104.3	102.8	105.9	▲▲
中性脂肪高値	12,078	3,572	3,282.1	108.8	106.0	111.7	▲▲
HDL-C低値	12,080	1,096	1,089.6	100.6	95.3	106.2	▲
LDL-C高値	12,073	6,358	6,100.0	104.2	102.6	105.9	▲▲
脂質異常	12,080	8,092	7,795.0	103.8	102.6	105.1	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 拡張期血圧高値, 血圧高値, 中性脂肪高値, LDL-C高値, 脂質異常, 空腹時血糖高値, 血糖高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... HbA1c高値,

相双(平成27年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	13,286	1,564	1,296.9	120.6	115.4	126.0	▲▲
メタボ予備群	13,286	864	826	105	98	111	▲
肥満者	13,287	4,278	3,814.9	112.1	109.5	114.8	▲▲
高血圧症有病者	13,288	5,183	4,989.9	103.9	101.8	106.0	▲▲
高血圧症予備群	12,599	1,691	1,728.3	97.8	93.8	102.1	▽
糖尿病有病者	13,288	1,124	957.5	117.4	111.3	123.7	▲▲
糖尿病予備群	12,243	1,709	1,831.1	93.3	89.5	97.3	▽▽
脂質異常症有病者	13,288	7,949	7,255.3	109.6	108.1	111.0	▲▲
習慣的喫煙者	13,288	1,102	1,111.0	99.2	94.0	104.7	▽
習慣的飲酒者	12,100	1,045	1,242.4	84.1	79.5	88.9	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ該当者, 肥満者, 高血圧症有病者, 糖尿病有病者, 脂質異常症有病者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病予備群, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	12,599	5,044	4,880.8	103.3	101.3	105.5	▲▲
拡張期血圧高値	12,599	1,912	1,924.5	99.3	95.5	103.3	▽
血圧高値	12,599	5,335	5,144.4	103.7	101.7	105.7	▲▲
空腹時血糖高値	9,767	3,220	2,925.3	110.1	107.2	113.0	▲▲
HbA1c高値	10,831	5,256	5,566.7	94.4	92.7	96.2	▽▽
血糖高値	12,243	6,344	6,279.9	101.0	99.4	102.7	▲
中性脂肪高値	12,993	1,933	1,733.3	111.5	107.3	116.0	▲▲
HDL-C低値	12,994	256	245.9	104.1	92.7	116.8	▲
LDL-C高値	12,992	7,627	7,403.3	103.0	101.6	104.5	▲▲
脂質異常	12,995	8,367	8,041.4	104.0	102.8	105.3	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 収縮期血圧高値, 血圧高値, 空腹時血糖高値, 中性脂肪高値, LDL-C高値, 脂質異常,
- ・有意に低い(▽▽) ... HbA1c高値,

いわき(平成27年度)

標準化 該当比(男性)



1)

項目	男 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	21,680	5,606	5,502.7	101.9	99.8	104.0	▲
メタボ予備群	21,680	4,129	3,878.0	106.5	103.8	109.2	▲▲
肥満者	21,680	11,953	11,577.8	103.2	102.1	104.4	▲▲
高血圧症有病者	21,684	10,134	10,029.6	101.0	99.7	102.4	▲
高血圧症予備群	20,495	2,989	3,004.0	99.5	96.5	102.6	▽
糖尿病有病者	21,684	2,783	2,773.9	100.3	97.2	103.6	▲
糖尿病予備群	14,861	1,994	2,248.7	88.7	85.3	92.1	▽▽
脂質異常症有病者	21,684	11,784	11,993.9	98.3	97.2	99.4	▽▽
習慣的喫煙者	21,684	8,243	7,987.4	103.2	101.6	104.8	▲▲
習慣的飲酒者	20,196	8,958	9,260.9	96.7	95.4	98.1	▽▽

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ予備群, 肥満者, 習慣的喫煙者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病予備群, 脂質異常症有病者, 習慣的飲酒者,

2)


収縮期血圧高値	20497	9,463	9,562.4	99.0	97.6	100.3	▽
拡張期血圧高値	20,495	5,214	5,678.4	91.8	89.8	93.8	▽▽
血圧高値	20,497	10,287	10,418.0	98.7	97.5	100.0	▽▽
空腹時血糖高値	5,288	2,311	2,264.1	102.1	99.1	105.1	▲
HbA1c高値	11,210	5,861	5,670.0	103.4	101.7	105.1	▲▲
血糖高値	14,861	7,731	8,243.2	93.8	92.4	95.1	▽▽
中性脂肪高値	20,268	5,791	5,644.6	102.6	100.5	104.7	▲▲
HDL-C低値	20,273	1,822	1,847.8	98.6	94.7	102.7	▽
LDL-C高値	20,182	10,641	10,403.5	102.3	101.1	103.5	▲▲
脂質異常	20,275	13,375	13,256.1	100.9	100.0	101.8	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 中性脂肪高値, LDL-C高値, HbA1c高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, 血圧高値, 血糖高値,

いわき(平成27年度)

標準化 該当比(女性)



1)

項目	女 性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
メタボ該当者	20,570	1,887	1,911.1	98.7	94.9	102.8	▽
メタボ予備群	20,570	1,340	1,261	106	101	111	▲▲
肥満者	20,569	5,791	5,841.8	99.1	97.1	101.2	▽
高血圧症有病者	20,572	7,724	7,389.2	104.5	102.8	106.3	▲▲
高血圧症予備群	19,799	2,687	2,663.4	100.9	97.7	104.2	▲
糖尿病有病者	20,572	1,349	1,403.9	96.1	91.6	100.8	▽
糖尿病予備群	16,693	2,142	2,446.5	87.6	84.4	90.9	▽▽
脂質異常症有病者	20,572	10,749	10,799.3	99.5	98.3	100.7	▽
習慣的喫煙者	20,571	2,325	1,856.6	125.2	120.9	129.7	▲▲
習慣的飲酒者	19,820	2,279	2,111.8	107.9	104.1	111.8	▲▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... メタボ予備群, 高血圧症有病者, 習慣的喫煙者, 習慣的飲酒者,
- ・有意に低い(▽▽) ... 糖尿病予備群,

2)

収縮期血圧高値	19,799	7,509	7,441.8	100.9	99.3	102.6	▲
拡張期血圧高値	19,799	2,812	2,971.3	94.6	91.7	97.7	▽▽
血圧高値	19,799	7,916	7,860.1	100.7	99.1	102.3	▲
空腹時血糖高値	4,762	1,087	1,102.2	98.6	93.7	103.8	▽
HbA1c高値	13,677	6,833	6,995.3	97.7	96.2	99.2	▽▽
血糖高値	16,693	7,642	8,407.8	90.9	89.5	92.3	▽▽
中性脂肪高値	19,639	2,668	2,547.7	104.7	101.3	108.2	▲▲
HDL-C低値	19,639	322	371.7	86.6	78.2	95.9	▽▽
LDL-C高値	19,622	11,016	10,968.3	100.4	99.3	101.6	▲
脂質異常	19,639	11,952	11,924.8	100.2	99.2	101.3	▲

福島県(データ全体)の結果(基準)と比べ、

- ・有意に高い(▲▲) ... 中性脂肪高値,
- ・有意に低い(▽▽) ... 拡張期血圧高値, HbA1c高値, 血糖高値, HDL-C低値,