

[平成27年度]

7. 福島県 いわき地域の状況

(1)特定健診受診者(人数・割合)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	3,032	2,814	2,695	2,997	3,449	3,915	2,782	21,684
	割合	13.98%	12.98%	12.43%	13.82%	15.91%	18.05%	12.83%	100.0%
女性	人数	2,154	2,049	2,419	2,613	3,394	4,427	3,516	20,572
	割合	10.47%	9.96%	11.76%	12.70%	16.50%	21.52%	17.09%	100.0%
計	人数	5,186	4,863	5,114	5,610	6,843	8,342	6,298	42,256
	割合	12.27%	11.51%	12.10%	13.28%	16.19%	19.74%	14.90%	100.0%

(2)検査項目別平均値

		BMI	腹囲	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL コレステロール	LDL コレステロール	GOT	GPT	γ -GTP	空腹時血糖	HbA1c	血清 クレアチニン
男性	度数	21,698	21,694	20,510	9,348	8,302	8,304	8,296	9,447	9,447	9,438	5,295	11,225	111
	平均値	24	86	128	76	－	－	120	－	－	－	－	－	－
	標準偏差	4	9	16	10	－	－	30	－	－	－	－	－	－
	中央値	－	－	－	－	107	55	－	23	22	33	98	5.6	0.80
	25パーセン タイル値	－	－	－	－	76	46	－	20	16	22	91	5.3	0.80
	75パーセン タイル値	－	－	－	－	156	65	－	28	30	55	108	5.9	0.90
女性	度数	20,581	20,578	19,808	11,439	10,952	10,952	10,952	11,529	11,529	11,528	4,765	13,687	52
	平均値	23	81	124	74	－	－	127	－	－	－	－	－	－
	標準偏差	4	10	16	10	－	－	31	－	－	－	－	－	－
	中央値	－	－	－	－	92	65	－	22	17	19	92	5.5	0.60
	25パーセン タイル値	－	－	－	－	68	55	－	19	14	15	86	5.3	0.50
	75パーセン タイル値	－	－	－	－	128	76	－	25	22	28	99	5.8	0.60

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible]

(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI<25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	1,711 79.4%	1,505 73.5%	1,778 73.5%	1,904 72.9%	2,425 71.4%	3,069 69.4%	2,386 67.9%	14,778 71.8%
BMI≥25、 腹囲<85/90cm	人数 割合	162 7.5%	212 10.3%	247 10.2%	247 9.5%	327 9.6%	422 9.5%	356 10.1%	1,973 9.6%
BMI<25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	23 1.1%	24 1.2%	46 1.9%	73 2.8%	128 3.8%	209 4.7%	200 5.7%	703 3.4%
BMI≥25、 腹囲≥85/90cm	人数 割合	258 12.0%	308 15.0%	347 14.4%	389 14.9%	514 15.1%	725 16.4%	574 16.3%	3,115 15.1%
合計	人数 割合	2,154 100.0%	2,049 100.0%	2,418 100.0%	2,613 100.0%	3,394 100.0%	4,425 100.0%	3,516 100.0%	20,569 100.0%

[平成27年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1,814	1,386	1,077	1,001	926	946	587	7,737
	割合	64%	53%	42%	35%	28%	25%	21%	37%
予備群	人数	455	430	401	465	477	452	309	2,989
	割合	15.9%	16.3%	15.7%	16.2%	14.3%	11.7%	11.2%	14.3%
有病者	人数	586	823	1,070	1,401	1,923	2,459	1,872	10,134
	割合	20.5%	31.2%	42.0%	48.9%	57.8%	63.8%	67.6%	48.6%
合計	人数	2,855	2,639	2,548	2,867	3,326	3,857	2,768	20,860
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1,672	1,393	1,366	1,301	1,445	1,449	921	9,547
	割合	82.3%	71.7%	59.7%	52.0%	43.8%	33.0%	26.3%	47.8%
予備群	人数	184	267	294	351	490	633	468	2,687
	割合	9.1%	13.7%	12.8%	14.0%	14.9%	14.4%	13.4%	13.5%
有病者	人数	176	282	628	851	1,364	2,307	2,116	7,724
	割合	8.7%	14.5%	27.4%	34.0%	41.3%	52.6%	60.4%	38.7%
合計	人数	2,032	1,942	2,288	2,503	3,299	4,389	3,505	19,958
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(5)-② 血圧高値(収縮期血圧高値・拡張期血圧高値・血圧高値)の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
収縮期血圧 高値	人数	800	922	1,067	1,378	1,699	2,099	1,498	9,463
	割合	28.2%	35.5%	42.7%	49.2%	52.6%	55.4%	54.6%	22.4%
拡張期血圧 高値	人数	648	734	819	927	898	789	399	5,214
	割合	22.8%	28.3%	32.8%	33.1%	27.8%	20.8%	14.6%	12.3%
血圧高値	人数	955	1,085	1,213	1,515	1,804	2,180	1,535	10,287
	割合	33.6%	41.8%	48.6%	54.0%	55.8%	57.6%	56.0%	24.3%

平成27年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
収縮期血圧 高値	人数	271	444	680	866	1,363	2,103	1,782	7,509
	割合	13.4%	23.0%	30.1%	35.0%	41.8%	48.3%	51.0%	17.9%
拡張期血圧 高値	人数	197	252	405	437	495	609	417	2,812
	割合	9.7%	13.1%	18.0%	17.7%	15.2%	14.0%	11.9%	6.7%
血圧高値	人数	326	496	744	935	1,425	2,169	1,821	7,916
	割合	16.1%	25.7%	33.0%	37.8%	43.7%	49.8%	52.1%	18.8%

[平成27年度]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1,591	1,289	1,155	1,240	1,526	2,087	1,713	10,601
	割合	86.6%	77.7%	70.8%	65.0%	63.5%	63.1%	65.1%	68.9%
予備群	人数	134	171	197	275	345	466	406	1,994
	割合	7.3%	10.3%	12.1%	14.4%	14.4%	14.1%	15.4%	13.0%
有病者	人数	113	200	279	392	533	754	512	2,783
	割合	6.1%	12.0%	17.1%	20.6%	22.2%	22.8%	19.5%	18.1%
合計	人数	1,838	1,660	1,631	1,907	2,404	3,307	2,631	15,378
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1,383	1,281	1,384	1,523	2,205	3,057	2,473	13,306
	割合	93.7%	90.5%	83.9%	81.4%	77.9%	73.9%	72.4%	79.2%
予備群	人数	62	84	164	207	371	655	599	2,142
	割合	4.2%	5.9%	9.9%	11.1%	13.1%	15.8%	17.5%	12.8%
有病者	人数	31	50	101	141	256	427	343	1,349
	割合	2.1%	3.5%	6.1%	7.5%	9.0%	10.3%	10.0%	8.0%
合計	人数	1,476	1,415	1,649	1,871	2,832	4,139	3,415	16,797
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(6)-② 血糖高値(空腹時血糖高値・HbA1c高値・血糖高値)の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
空腹時血糖高値	人数	268	313	387	490	479	289	85	2,311
	割合	24.8%	34.9%	46.5%	50.8%	53.7%	59.6%	61.6%	8.8%
HbA1c高値	人数	360	447	481	593	897	1,645	1,438	5,861
	割合	34.8%	46.1%	49.7%	52.3%	53.6%	56.7%	56.8%	22.1%
血糖高値	人数	594	709	806	993	1,268	1,861	1,500	7,731
	割合	32.7%	44.0%	51.3%	55.0%	56.4%	58.2%	57.5%	20.4%

平成27年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
空腹時血糖高値	人数	89	137	191	247	235	154	34	1,087
	割合	10.3%	16.1%	20.4%	27.5%	33.5%	36.3%	37.8%	4.0%
HbA1c高値	人数	252	241	431	592	1,190	2,171	1,956	6,833
	割合	27.4%	28.8%	41.8%	46.4%	50.3%	56.0%	58.0%	21.6%
血糖高値	人数	322	348	582	779	1,356	2,284	1,971	7,642
	割合	21.9%	24.7%	35.6%	42.2%	48.4%	55.4%	57.8%	19.0%

[平成27年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1,546	1,342	1,194	1,364	1,493	1,714	1,247	9,900
	割合	51.0%	47.7%	44.3%	45.5%	43.3%	43.8%	44.8%	45.7%
有病者	人数	1,486	1,472	1,501	1,633	1,956	2,201	1,535	11,784
	割合	49.0%	52.3%	55.7%	54.5%	56.7%	56.2%	55.2%	54.3%
合計	人数	3,032	2,814	2,695	2,997	3,449	3,915	2,782	21,684
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

平成27年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1,723	1,466	1,412	1,224	1,346	1,482	1,170	9,823
	割合	80.0%	71.5%	58.4%	46.8%	39.7%	33.5%	33.3%	47.7%
有病者	人数	431	583	1,007	1,389	2,048	2,945	2,346	10,749
	割合	20.0%	28.5%	41.6%	53.2%	60.3%	66.5%	66.7%	52.3%
合計	人数	2,154	2,049	2,419	2,613	3,394	4,427	3,516	20,572
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(7)-② 脂質異常(中性脂肪高値・HDL-C低値・LDL-C高値・脂質異常高値)の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
中性脂肪高値	人数	851	815	794	797	911	994	629	5,791
	割合	31.3%	32.5%	32.5%	29.0%	28.2%	25.8%	22.7%	12.9%
HDL-C低値	人数	294	224	219	251	244	325	265	1,822
	割合	10.8%	8.9%	8.9%	9.1%	7.6%	8.4%	9.5%	4.1%
LDL-C高値	人数	1,566	1,474	1,388	1,491	1,689	1,839	1,194	10,641
	割合	57.8%	59.1%	56.9%	54.8%	52.6%	47.9%	43.1%	23.8%
脂質異常	人数	1,416	1,358	1,335	1,377	1,560	1,684	1,096	9,826
	割合	52.0%	54.2%	54.5%	50.1%	48.4%	43.8%	39.5%	21.9%

平成27年度 いわき地域(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
中性脂肪高値	人数	143	157	252	327	497	742	550	2,668
	割合	7.3%	8.4%	11.3%	13.4%	15.3%	16.9%	15.7%	5.9%
HDL-C低値	人数	29	41	26	34	39	85	68	322
	割合	1.5%	2.2%	1.2%	1.4%	1.2%	1.9%	1.9%	0.7%
LDL-C高値	人数	703	885	1,359	1,570	2,062	2,591	1,846	11,016
	割合	36.1%	47.3%	61.1%	64.2%	63.3%	59.1%	52.7%	24.2%
脂質異常	人数	409	545	869	1,109	1,450	1,898	1,331	7,611
	割合	21.0%	29.0%	39.0%	45.4%	44.5%	43.3%	38.0%	16.7%

[平成27年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

[illegible][illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible][illegible]

[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible]

[平成27年度]

(11)習慣的喫煙者の割合

平成27年度 いわき地域(男性)

[illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)

[illegible]

(12) 習慣的飲酒者の割合

平成27年度 いわき地域(男性)



[illegible]

平成27年度 いわき地域(女性)



[illegible]

[平成27年度]

(3)メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合




(4)肥満者(BMI25以上または腹囲基準値以上)の割合




[平成27年度]

(5)-① 高血圧症有病者等の割合





(5)-②-A 収縮期血圧高値の割合





[平成27年度]

(5)-②-B 拡張期血圧高値の割合





(5)-②-C 血圧高値の割合





[平成27年度]

(6)-① 糖尿病有病者等の割合





(6)-②-A 空腹時血糖高値の割合





[平成27年度]

(6)-②-B HbA1c高値の割合





(6)-②-C 血糖高値の割合





[平成27年度]

(7)-① 脂質異常症有病者の割合





(7)-②-A 中性脂肪高値の割合





[平成27年度]

(7)-②-B HDLコレステロール低値の割合





(7)-②-C LDLコレステロール高値の割合




[平成27年度]

(7)-②-D 脂質異常の割合




[平成27年度]

(8)肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合




[平成27年度]

(9)-① 血圧を下げる薬など服薬の有無別にみた高血圧症有病者等の割合




(9)-② 血糖を下げる薬など服薬の有無別にみた糖尿病有病者等の割合





[平成27年度]

(9)-③ コレステロールを下げる薬など服薬の有無別にみた脂質異常症有病者の割合




[平成27年度]

(10)尿蛋白(+)以上の割合



[平成27年度]

(11) 習慣的喫煙者の割合



(12) 習慣的飲酒者の割合

